

レジメン一覧(レジメン名・1コースの期間・抗がん剤の用量・投与Day) 「※CTRL+F」で検索が可能です。

注:血液内科等のレジメンは組み合わせて使用するものもあります(R-CHOP→レジメン名:RITとCHOP等)。不明な場合は別途お問い合わせください。

更新時：2025/07/16

診療科	がん種	レジメン名	コース期間	薬品	基準値		Day
消化器科	胃がん	weekly-PTX80	28	パクリタキセル注(30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 8, 15
消化器科	胃がん	tri-weekly DTX	21	ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
消化器科	胃がん	bi-weekly CPT	14	イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V)	150	mg/m ²	1
消化器科	胃がん	TS-1&CCDP	35	エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~21
				シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	8
消化器科	胃がん	Short Hydration TS-1&CCDP	35	エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~21
				シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ² (体表面積別)	8
消化器科	胃がん	TS-1&CCDP+Tmab【初回(ロディングドーズ)】	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	TS-1&CCDP+Tmab(2コース以降)	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	Short Hydration TS-1&CCDP+Tmab【初回(ロディングドーズ)】	21	シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	Short Hydration TS-1&CCDP+Tmab(2コース以降)	21	シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	XP+trastuzumab【初回(ロディングドーズ)】	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	XP+trastuzumab(2コース以降)	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	XP+trastuzumab Short Hydration【初回(ロディングドーズ)】	21	シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	XP+trastuzumab Short Hydration(2コース以降)	21	シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	RAM+PTX(1コース目)	28	サイラムザ点滴静注(100, 500mg/V)	8	mg/kg	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1
				サイラムザ点滴静注(100, 500mg/V)	8	mg/kg	15
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	80	mg/m ²	15
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	80	mg/m ²	8
消化器科	胃がん	RAM+PTX(2コース目以降)	28	サイラムザ点滴静注(100, 500mg/V)	8	mg/kg	1, 15
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 15
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	80	mg/m ²	8
消化器科	胃がん	CapeOX(XELOX)	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V)	130	mg/m ²	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	SOX	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V)	130	mg/m ²	1
				エスワнтаイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	Abraxane-3W	21	アブラキサ点点滴静注用(100mg/V)	260	mg/m ²	1
消化器科	胃がん	ニボルマブ	14	オプジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	240	mg	1
消化器科	胃がん	CapeOX(XELOX)+Tmab【初回(ロディングドーズ)】	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V)	130	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	CapeOX(XELOX)+Tmab(2コース以降)	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V)	130	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
				カベシタビン300mg「ヤルト」	2000	mg/m ² (体表面積別)	1~14
消化器科	胃がん	SOX+Tmab【初回(ロディングドーズ)】	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V)	130	mg/m ²	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1

消化器科	胃がん	SOX+Tmab (2コース以降)	21	エスワントaiホウ配合OD錠 エルプラット注射用 (50, 100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V)	80 130 6	mg/m ² (体表面積別) mg/m ² mg/kg	1 1 1
消化器科	胃がん	m-FOLF0X6+Tmab 【初回(ロ-デ`ィンクド`-ス`)】	21	エスワントaiホウ配合OD錠 5ーF U注 (100mL用) (250, 1000mg/V) 5ーF U注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V)	80 2400 400 85 8	mg/m ² (体表面積別) mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1 1
消化器科	胃がん	m-FOLF0X6+Tmab (2コース以降)	21	5ーF U注 (100mL用) (250, 1000mg/V) 5ーF U注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V)	2400 400 85 6	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	胃がん	Tmab 6mg/kg (FOLF0X併用)	21	トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
消化器科	胃がん	トラスツズマブデルクステカン (初回)	21	エンハーツ点滴静注用 (100mg/V)	6. 4	mg/kg	1
消化器科	胃がん	トラスツズマブデルクステカン (初回) 【70カリスあり】	21	エンハーツ点滴静注用 (100mg/V)	6. 4	mg/kg	1
消化器科	胃がん	トラスツズマブデルクステカン (2コース以降)	21	エンハーツ点滴静注用 (100mg/V)	6. 4	mg/kg	1
消化器科	胃がん	トラスツズマブデルクステカン (2コース以降) 【70カリスあり】	21	エンハーツ点滴静注用 (100mg/V)	6. 4	mg/kg	1
消化器科	胃がん	Nivo+S0X	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) オブジーボ点滴静注 (3, 6週用) (120, 240mg/V) エスワントaiホウ配合OD錠	130 360 80	mg/m ² mg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	胃がん	Nivo+Cape0X	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) オブジーボ点滴静注 (3, 6週用) (120, 240mg/V) カベシタビン300mg「ヤクルト」	130 360 2000	mg/m ² mg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	胃がん	Nivo+m-FOLF0X6	14	5ーF U注 (100mL用) (250, 1000mg/V) 5ーF U注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V) オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	2400 400 85 240	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg	1 1 1 1
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+S0X	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) エスワントaiホウ配合OD錠	130 200 80	mg/m ² mg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Cape0X	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) カベシタビン300mg「ヤクルト」	130 200 2000	mg/m ² mg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+FP 【初回(ロ-デ`ィンクド`-ス`)】	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V) 5ーF U注 (250, 1000mg/V)	200 80 8 800	mg mg/m ² mg/kg mg/m ²	1 1 1 1~5
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+FP (2コース以降)	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V) 5ーF U注 (250, 1000mg/V)	200 80 6 800	mg mg/m ² mg/kg mg/m ²	1 1 1 1~5
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+Cape0X (XELOX) 【初回(ロ-デ`ィンクド`-ス`)】	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V) カベシタビン300mg「ヤクルト」	130 200 8 2000	mg/m ² mg mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1 1~14
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+Cape0X (XELOX) (2コース以降)	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V) カベシタビン300mg「ヤクルト」	130 200 6 2000	mg/m ² mg mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1 1~14
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+S0X 【初回(ロ-デ`ィンクド`-ス`)】	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V) エスワントaiホウ配合OD錠	130 200 8 80	mg/m ² mg mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1 1~14
消化器科	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+S0X (2コース以降)	21	エルプラット注射用 (50, 100mg/V) キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用 (60, 150mg/V) エスワントaiホウ配合OD錠	130 200 6 80	mg/m ² mg mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1 1~14

消化器科	胃がん	ゾールベ [®] ツキシマブ [®] +m-FOLFOX6 (初回) ★入院限定	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ピロイ点滴静注用 (100mg/V)	2400 400 85 800	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1
消化器科	胃がん	ゾールベ [®] ツキシマブ [®] +m-FOLFOX6 (2コース目以降) 【BSA1. 2以上】	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ピロイ点滴静注用 (100mg/V)	2400 400 85 400	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1
消化器科	胃がん	ゾールベ [®] ツキシマブ [®] +Cape0X (初回) ★入院限定	21	エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ピロイ点滴静注用 (100mg/V) カベシタビン300mg「ヤクルト」	130 800 2000	mg/m ² mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1 1～14
消化器科	胃がん	ゾールベ [®] ツキシマブ [®] +Cape0X (2コース目以降) 【BSA1. 2以上】	21	エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ピロイ点滴静注用 (100mg/V) カベシタビン300mg「ヤクルト」	130 600 2000	mg/m ² mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1 1～14
消化器科	胃がん	m-FOLFOX6	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルブラット注射用 (50, 100mg/V)	2400 400 85	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1
消化器科	胃がん	TS1&DTX	21	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	40 80	mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1～14
消化器科	胃がん	TS1&DTX (術後補助化学療法 2～7コース)	21	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	40 80	mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1～14
消化器科	胃がん	RAM+nab-PTX (1コース目)	28	アブラキサン点滴静注用 (100mg/V) サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V) アブラキサン点滴静注用 (100mg/V) サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V) アブラキサン点滴静注用 (100mg/V)	100 8 100 8 100	mg/m ² mg/kg mg/m ² mg/kg mg/m ²	1 1 15 15 8
消化器科	胃がん	RAM+nab-PTX (2コース目以降)	28	アブラキサン点滴静注用 (100mg/V) サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V) アブラキサン点滴静注用 (100mg/V)	100 8 100	mg/m ² mg/kg mg/m ²	1, 15 1, 15 8
消化器科	肝臓がん	アテゾリズマブ+ベバシズマブ (1コース目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V) テセントリク点滴静注 (1200mg/V)	15 1200	mg/kg mg	1 1
消化器科	肝臓がん	アテゾリズマブ+ベバシズマブ (2コース目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V) テセントリク点滴静注 (1200mg/V)	15 1200	mg/kg mg	1 1
消化器科	肝臓がん	アテゾリズマブ+ベバシズマブ (3コース目以降)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V) テセントリク点滴静注 (1200mg/V)	15 1200	mg/kg mg	1 1
消化器科	肝臓がん	イミフィンジ+イジニト [®] 併用療法 (1コース目) (体重30kg以上)	28	イジニト点滴静注 (300mg/V) イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	300 1500	mg mg	1 1
消化器科	肝臓がん	イミフィンジ+イジニト [®] 併用療法 (2コース目以降) (体重30kg以上)	28	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	Bv+IRIS (1コース目)	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ベバシズマブBS (100, 400mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠 イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ベバシズマブBS (100, 400mg/V)	100 5 80 100 5	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別) mg/m ² mg/kg	1 1 1～14 15 15
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	Bv+IRIS (2コース以降)	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ベバシズマブBS (100, 400mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	100 5 80	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1, 15 1, 15 1～14
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	CRT-IRIS 【S1】	5	エスワントাইホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1～5 放射線にあわせて
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	CRT-IRIS 【OPT】	7	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60	mg/m ²	1
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	CRT-S1	5	エスワントাইホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1～5 放射線にあわせて
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	Bv+S0X (1コース目)	21	エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ベバシズマブBS (100, 400mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	130 7. 5 80	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1～14
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	Bv+S0X (2コース目)	21	エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ベバシズマブBS (100, 400mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	130 7. 5 80	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1～14
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	Bv+S0X (3コース目以降)	21	エルブラット注射用 (50, 100mg/V) ベバシズマブBS (100, 400mg/V)	130 7. 5	mg/m ² mg/kg	1 1

消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	S0X	21	エスワンタイホウ配合0D錠 エルブラット注射用(50, 100mg/V)	80 130	mg/m ² (体表面積別) mg/m ²	1~14 1
消化器科	結腸・直腸-S1 ⁺ -s	CRT_S1+MMC	42	エスワンタイホウ配合0D錠 マイトマイシン注用(2, 10mg/V)	80 10	mg/m ² (体表面積別) mg/m ²	1~14 1, 29
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+XELIRI(1コース目)	21	イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	200 7.5 1800	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+XELIRI(2コース目)	21	イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	200 7.5 1800	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+XELIRI(3コース以降)	21	イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	200 7.5 1800	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Cape0X(XELOX)	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	130 2000	mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+Cape0X(XELOX)(1コース目)	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	130 7.5 2000	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+Cape0X(XELOX)(2コース目)	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	130 7.5 2000	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+Cape0X(XELOX)(3コース目以降)	21	エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	130 7.5 2000	mg/m ² mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+Capecitabine(1コース目)	21	ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	7.5 2000	mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+Capecitabine(2コース目)	21	ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	7.5 2000	mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1~14
消化器科	結腸・直腸-Xeloda ⁺ -s	Bv+Capecitabine(3コース目以降)	21	ペバシズマブBS(100, 400mg/V) カベシタビン300mg「ヤルト」	7.5 2000	mg/kg mg/m ² (体表面積別)	1 1~14
消化器科	結腸・直腸-その他	FOLFOXIRI(JACCRO CC-13試験 P II)	14	5-FU注(100mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V)	2400 150 85	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(1コース目)【TRIBE試験】	14	5-FU注(150mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V)	3200 165 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(2コース目)【TRIBE試験】	14	5-FU注(150mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V)	3200 165 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(3コース以降)【TRIBE試験】	14	5-FU注(150mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V)	3200 165 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(1コース目)【JACCRO CC-11試験 P II】	14	5-FU注(100mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V)	2400 150 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(2コース目)【JACCRO CC-11試験 P II】	14	5-FU注(100mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V) ペバシズマブBS(100, 400mg/V)	2400 150 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(3コース目以降)【JACCRO CC-11試験 P II】	14	5-FU注(100mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルブラット注射用(50, 100mg/V)	2400 150 85	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1

消化器科	結腸・直腸-その他	Cmab+CPT-11(1コース目)	14	ペバシズマブBS(100, 400mg/V) アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V)	5 400 150	mg/kg mg/ml mg/ml	1 1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Cmab+CPT-11(2コース目以降)	14	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V)	250 150	mg/ml mg/ml	8 1
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ+ビニチニブ】(1コース目)	7	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V) アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg メクトビ錠15mg	400 300 90	mg/ml mg mg	1 1~7 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ+ビニチニブ】(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg メクトビ錠15mg	250 300 90	mg/ml mg mg	1 1~7 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ+ビニチニブ】(1コース目)【院内用】	7	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg メクトビ錠15mg	400 300 90	mg/ml mg mg	1 1~7 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ+ビニチニブ】(2コース目以降)【院内用】	7	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg メクトビ錠15mg	250 300 90	mg/ml mg mg	1 1~7 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+インコラフェニブ+ビニチニブ】	14	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg メクトビ錠15mg	500 300 90	mg/ml mg mg	1 1~14 1~14
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+インコラフェニブ+ビニチニブ】【院内用】	14	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg メクトビ錠15mg	500 300 90	mg/ml mg mg	1 1~14 1~14
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ】(1コース目)	7	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg	400 300	mg/ml mg	1 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ】(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg	250 300	mg/ml mg	1 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ】(1コース目)【院内用】	7	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg	400 300	mg/ml mg	1 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+インコラフェニブ】(2コース目以降)【院内用】	7	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg	250 300	mg/ml mg	1 1~7
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+インコラフェニブ】	14	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg	500 300	mg/ml mg	1 1~14
消化器科	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+インコラフェニブ】【院内用】	14	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V) ピラフトピカブセル75mg	500 300	mg/ml mg	1 1~14
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+ロンサーフ	28	ペバシズマブBS(100, 400mg/V) ロンサーフ配合錠	5 70	mg/kg mg/ml(体表面積別)	1, 15 1~5, 8~12
消化器科	結腸・直腸-その他	Bv+ロンサーフ【院内用】	28	ペバシズマブBS(100, 400mg/V) ロンサーフ配合錠	5 70	mg/kg mg/ml(体表面積別)	1, 15 1~5, 8~12
消化器科	結腸・直腸-その他	トラスツズマブ+ペルツズマブ【初回(ロディングドーズ)】	21	ハーセプチン注射用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	8 840	mg/kg mg	1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	トラスツズマブ+ペルツズマブ【2コース以降】	21	ハーセプチン注射用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	6 420	mg/kg mg	1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Pembrolizumab(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
消化器科	結腸・直腸-その他	Ipi+Nivo(二次治療以降)	21	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V) ヤーボイ点滴静注(20, 50mg/V)	240 1	mg mg/kg	1 1
消化器科	結腸・直腸-その他	Nivo単剤(2週毎)(二次治療以降)	14	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	240	mg	1
消化器科	結腸・直腸-その他	Nivo単剤(4週毎)(二次治療以降)	28	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	480	mg	1
消化器科	結腸・直腸-分子標的薬単独	Pmab	14	ベクティビックス点滴静注(100mg/V)	6	mg/kg	1
消化器科	結腸・直腸-分子標的薬単独	Cmab(初回)	7	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V)	400	mg/ml	1
消化器科	結腸・直腸-分子標的薬単独	Cmab(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100, 500mg/V)	250	mg/ml	1
消化器科	結腸・直腸-分子標的薬単独	Cmab【隔週投与】	14	アービタックス注射液(500ml)(100, 500mg/V)	500	mg/ml	1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRIベース	FOLFIRI	14	5-FU注(100mL用)(250, 1000mg/V) 5-FU注(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V)	2400 400 150	mg/ml mg/ml mg/ml	1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRIベース	Bv+FOLFIRI(1コース目)	14	5-FU注(100mL用)(250, 1000mg/V)	2400	mg/ml	1

				５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	400 150 5	mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Bv+FOLFIRI (2 コース目)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	2400 400 150 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Bv+FOLFIRI (3 コース目以降)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	2400 400 150 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Cmab+FOLFIRI (1 コース目)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	2400 400 400 150 250	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1 8
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Cmab+FOLFIRI (2 コース以降)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	2400 400 150 250	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1, 8
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Cmab+FOLFIRI 【隔週投与】	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	2400 400 500 150	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	RAM+FOLFIRI (1コース目)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V)	2400 400 150 8	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	RAM+FOLFIRI (2コース目以降)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V)	2400 400 150 8	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Pmab+FOLFIRI	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ペクティビックス点滴静注 (100mg/V)	2400 400 150 6	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFIRI ^{ペー} ス	Aflibercept+FOLFIRI	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) ザルトラップ点滴静注 (100, 200mg/V)	2400 400 150 4	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFOX ^{ペー} ス	m-FOLFOX6	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V)	2400 400 85	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFOX ^{ペー} ス	Bv+m-FOLFOX6 (1 コース目)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V) ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	2400 400 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFOX ^{ペー} ス	Bv+m-FOLFOX6 (2 コース目)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V) ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	2400 400 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFOX ^{ペー} ス	Bv+m-FOLFOX6 (3 コース目以降)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V) エルプラット注射用 (50, 100mg/V) ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	2400 400 85 5	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/kg	1 1 1 1
消化器科	結腸・直腸FOLFOX ^{ペー} ス	Cmab+m-FOLFOX6 (1 コース目)	14	５－ＦＵ注 (100mL用) (250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注 (250, 1000mg/V)	2400 400	mg/m ² mg/m ²	1 1

				アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V)	400	mg/m ²	1
				エルプラット注射用 (50, 100mg/V)	85	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	8
消化器科	結腸・直腸FOLF0X ⁶ -s	Cmab+m-FOLF0X6 (2 コース目以降)	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				エルプラット注射用 (50, 100mg/V)	85	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	1, 8
消化器科	結腸・直腸FOLF0X ⁶ -s	Cmab+m-FOLF0X6 【隔週投与】	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				エルプラット注射用 (50, 100mg/V)	85	mg/m ²	1
消化器科	結腸・直腸FOLF0X ⁶ -s	Pmab+m-FOLF0X6	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				エルプラット注射用 (50, 100mg/V)	85	mg/m ²	1
				ベクティビックス点滴静注 (100mg/V)	6	mg/kg	1
消化器科	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -s	sLV5FU2	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
消化器科	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -s	Bv+sLV5FU2 (1 コース目)	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	5	mg/kg	1
消化器科	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -s	Bv+sLV5FU2 (2 コース目)	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	5	mg/kg	1
消化器科	結腸・直腸sLV5FU2 ⁶ -s	Bv+sLV5FU2 (3 コース目以降)	14	5-FU 注 (100mL用) (250, 1000mg/V)	2400	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				ペバシズマブBS (100, 400mg/V)	5	mg/kg	1
消化器科	食道がん	tri-weekly DTX	21	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
消化器科	食道がん	weekly-PTX	49	パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	100	mg/m ²	1, 8, 15, 22, 29, 36
消化器科	食道がん	Nivo (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1
消化器科	食道がん	Nivo (2週毎) 【術後補助療法】	14	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1
消化器科	食道がん	Nivo (4週毎)	28	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	480	mg	1
消化器科	食道がん	Nivo (4週毎) 【術後補助療法】	28	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	480	mg	1
消化器科	食道がん	Ipi+Nivo (2週毎)	42	ヤーボイ点滴静注液 (20, 50mg/V)	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1, 15, 29
消化器科	食道がん	Ipi+Nivo (3週毎)	42	ヤーボイ点滴静注液 (20, 50mg/V)	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注 (3, 6週用) (120, 240mg/V)	360	mg	1, 22
消化器科	食道がん	FP+Nivo (2週毎)	28	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	800	mg/m ²	1~5
				オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	15
消化器科	食道がん	FP+Nivo (4週毎)	28	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	480	mg	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	800	mg/m ²	1~5
消化器科	食道がん	FP+Nivo (2週毎) Short Hydration 【5-FU : シュアフェーザーホップ】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5-FU (250ml) 【120時間用】 (250, 1000mg/V)	4000	mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	15
消化器科	食道がん	FP+Nivo (4週毎) Short Hydration 【5-FU : シュアフェーザーホップ】 (短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5-FU (250ml) 【120時間用】 (250, 1000mg/V)	4000	mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	480	mg	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
消化器科	食道がん	NAC_DCF	21	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	70	mg/m ²	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
				5-FU 注 (250, 1000mg/V)	750	mg/m ²	1~5
消化器科	食道がん	FP+RT療法	56	5-FU 注 (250, 1000mg/V)	750	mg/m ²	1~4, 29~32
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	70	mg/m ²	1, 29
消化器科	食道がん	standard-FP	28	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1

消化器科	食道がん	NAC-FP	21	５－ＦＵ注(250, 1000mg/V) シスプラチン注(500ml) (10, 50mg/V)	800 80	mg/㎡ mg/㎡	1～5 1
消化器科	食道がん	FP+キイトルーダ	21	５－ＦＵ注(250, 1000mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) シスプラチン注(500ml) (10, 50mg/V)	800 200 80	mg/㎡ mg mg/㎡	1～5 1 1
消化器科	食道がん	FP+キイトルーダ(維持療法)	21	５－ＦＵ注(250, 1000mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) ５－ＦＵ注(250, 1000mg/V)	800 200 800	mg/㎡ mg mg/㎡	1～5 1 1
消化器科	食道がん	FP+RT療法 Short Hydration【5-FU: シュアフェーザーポンプ】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	56	５－ＦＵ注(250ml)【96時間用】(250, 1000mg/V) シスプラチン注(500ml) (10, 50mg/V)	3000 70	mg/㎡ mg/㎡	1, 29 1, 29
消化器科	食道がん	standard-FP Short Hydration【5-FU: シュアフェーザーポンプ】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	５－ＦＵ(250ml)【120時間用】(250, 1000mg/V) シスプラチン注(500ml) (10, 50mg/V)	4000 80	mg/㎡ mg/㎡	1 1
消化器科	食道がん	NAC-FP Short Hydration【5-FU: シュアフェーザーポンプ】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	21	５－ＦＵ(250ml)【120時間用】(250, 1000mg/V) シスプラチン注(500ml) (10, 50mg/V)	4000 80	mg/㎡ mg/㎡	1 1
消化器科	食道がん	FP+キイトルーダ Short Hydration【5-FU: シュアフェーザーポンプ】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	21	５－ＦＵ(250ml)【120時間用】(250, 1000mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) シスプラチン注(500ml) (10, 50mg/V)	4000 200 80	mg/㎡ mg mg/㎡	1 1 1
消化器科	食道がん	FP+キイトルーダ(維持療法)【5-FU: シュアフェーザーポンプ】	21	５－ＦＵ(250ml)【120時間用】(250, 1000mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	4000 200	mg/㎡ mg	1 1
消化器科	膵臓・胆道癌	GEMUCITABIN(3投1休)	28	ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/㎡	1, 8, 15
消化器科	膵臓・胆道癌	GC療法	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V)	1000 25	mg/㎡ mg/㎡	1, 8 1, 8
消化器科	膵臓・胆道癌	FOLFIRINOX	14	５－ＦＵ注(100mL用)(250, 1000mg/V) ５－ＦＵ注(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルプラット注射用(50, 100mg/V)	2400 400 180 85	mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	1 1 1 1
消化器科	膵臓・胆道癌	modified FOLFIRINOX	14	５－ＦＵ注(100mL用)(250, 1000mg/V) イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V) エルプラット注射用(50, 100mg/V)	2400 150 85	mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	1 1 1
消化器科	膵臓・胆道癌	S-1&GEM(胆道がん)	21	エスワンタイホウ配合OD錠 ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	60 1000	mg/㎡(体表面積別) mg/㎡	1～14 1, 8
消化器科	膵臓・胆道癌	S-1&GEM(膵臓がん術前化学療法)	21	エスワンタイホウ配合OD錠 ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	80 1000	mg/㎡(体表面積別) mg/㎡	1～14 1, 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GEMUCITABIN(2投1休)	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/㎡	1, 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GC療法 Short Hydration	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V)	1000 25	mg/㎡ mg/㎡	1, 8 1, 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab療法(30kg以上) Short Hydration(マントールver.)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V)	1500 1000 25 1000 25	mg mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	1 1 1 8 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab療法(30kg以上) Short Hydration(フットミクver.)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V)	1500 1000 25 1000 25	mg mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	1 1 1 8 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab(30kg以上)維持療法	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500	mg	1
消化器科	膵臓・胆道癌	GC+Pembrolizumab療法 Short Hydration(マントールver.)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V) シスプラチン注(250ml) (10, 50mg/V)	200 1000 25 1000 25	mg mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡ mg/㎡	1 1 1 8 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GC+Pembrolizumab療法 Short Hydration(フットミクver.)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	200 1000	mg mg/㎡	1 1

				シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V) ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V) シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V)	25 1000 25	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 8 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GC+Pembrolizumab療法 (CDDPなし)	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V) ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V) ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V)	200 1000 1000	mg mg/m ² mg/m ²	1 1 8
消化器科	膵臓・胆道癌	GCS療法	14	ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V) シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	1000 25 80	mg/m ² mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~7
消化器科	膵臓・胆道癌	GCS療法 Short Hydration	14	ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V) シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V) エスワントাইホウ配合OD錠	1000 25 80	mg/m ² mg/m ² mg/m ² (体表面積別)	1 1 1~7
消化器科	膵臓・胆道癌	オニバイド+5-FU+I-LV	14	5-FU注 (100mL用) (250, 1000mg/V) オニバイド点滴静注 (43mg/V)	2400 70	mg/m ² mg/m ²	1 1
消化器科	膵臓・胆道癌	ABI/GEM	28	アブラキサン点滴静注用 (100mg/V) ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V)	125 1000	mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15
消化器科	膵臓・胆道癌	ストレプトゾシン	7	ザノサー点滴静注用 (1g/V)	1000	mg/m ²	1
呼吸器科	悪性胸膜中皮腫	ワジーボ (3週毎)+ヤーボイ	42	ヤーボイ点滴静注液 (20, 50mg/V) オブジーボ点滴静注 (3, 6週用) (120, 240mg/V)	1 360	mg/kg mg	1 1, 22
呼吸器科	悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM	21	アリムタ注射用 (100, 500mg/V) シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	500 75	mg/m ² mg/m ²	1 1
呼吸器科	小細胞癌	CDDP+CPT-11	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60 60 60	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 8, 15
呼吸器科	小細胞癌	CDDP+CPT-11 (short hydration)	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V) シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V) イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60 60 60	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 8, 15
呼吸器科	小細胞癌	CPT-11単剤	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	100	mg/m ²	1, 8, 15
呼吸器科	小細胞癌	CBDC+ETP	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V) ラステット注 (100mg/V) ラステット注 (100mg/V)	5 80 80	AUC mg/m ² mg/m ²	1 1 2~3
呼吸器科	小細胞癌	テセントリク+CBDC+ETP (1コース目)	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注 (1200mg/V) ラステット注 (100mg/V) ラステット注 (100mg/V)	5 1200 100 100	AUC mg mg/m ² mg/m ²	1 1 1 2~3
呼吸器科	小細胞癌	テセントリク+CBDC+ETP (2コース目以降)	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注 (1200mg/V) ラステット注 (100mg/V) ラステット注 (100mg/V)	5 1200 100 100	AUC mg mg/m ² mg/m ²	1 1 1 2~3
呼吸器科	小細胞癌	テセントリク+CBDC+ETP (維持療法)	21	テセントリク点滴静注 (1200mg/V)	1200	mg	1
呼吸器科	小細胞癌	ミフィンジ+CDDP+ETP (体重30kg以上)	21	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V) シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V) ラステット注 (100mg/V) ラステット注 (100mg/V)	1500 80 100 100	mg mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 2~3
呼吸器科	小細胞癌	ミフィンジ+CDDP+ETP 【維持療法】	28	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
呼吸器科	小細胞癌	ミフィンジ+CBDC+ETP (体重30kg以上)	21	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V) カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V) ラステット注 (100mg/V) ラステット注 (100mg/V)	1500 5 100 100	mg AUC mg/m ² mg/m ²	1 1 1 2~3
呼吸器科	小細胞癌	ミフィンジ+CBDC+ETP 【維持療法】	28	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
呼吸器科	小細胞癌	イムデトラ (1コース目) 【Day15はデケロンなし】	28	イムデトラ点滴静注用 (1mg/V) イムデトラ点滴静注用 (10mg/V) イムデトラ点滴静注用 (10mg/V)	1 10 10	mg mg mg	1 15 8
呼吸器科	小細胞癌	イムデトラ (2コース目以降) (デケロンなし)	28	イムデトラ点滴静注用 (10mg/V)	10	mg	1, 15
呼吸器科	小細胞癌	nab-PTX (weekly)	21	アブラキサン点滴静注用 (100mg/V)	100	mg/m ²	1, 8, 15
呼吸器科	小細胞癌	AMR単剤	28	カルセド注射用 (20, 50mg/V)	40	mg/m ²	1~3
呼吸器科	非小細胞癌	ワジーボ (2週毎)	14	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1

呼吸器科	非小細胞癌	パジール® (4週毎)	28	オブジーボ点滴静注 (2、4週用) (240mg/V)	480	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	nab-PTX (weekly)	21	アブラキサン点滴静注用 (100mg/V)	100	mg/m ²	1, 8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	AMR単剤	28	カルセド注射用 (20, 50mg/V)	40	mg/m ²	1~3
呼吸器科	非小細胞癌	PEM単剤	21	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
呼吸器科	非小細胞癌	CDDP+PEM	21	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	75	mg/m ²	1
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+PEM	21	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
呼吸器科	非小細胞癌	GEM1・8・15	28	ゲムシタピン点滴静注用 (200mg, 1g/V)	800	mg/m ²	1, 8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	【術後】CDDP+VNR	21	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				ロゼウス静注液 (40mg/V)	25	mg/m ²	1
				ロゼウス静注液 (40mg/V)	25	mg/m ²	8
呼吸器科	非小細胞癌	VNR単剤	21	ロゼウス静注液 (40mg/V)	25	mg/m ²	1, 8
呼吸器科	非小細胞癌	DTX単剤	21	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	60	mg/m ²	1
呼吸器科	非小細胞癌	DTX+RAM (1コース目)	21	サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	60	mg/m ²	1
呼吸器科	非小細胞癌	DTX+RAM (2コース目以降)	21	サイラムザ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	60	mg/m ²	1
呼吸器科	非小細胞癌	【放射線併用】CDDP+DTX (Short Hydration)	28	シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V)	40	mg/m ²	1, 8
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	40	mg/m ²	1, 8
呼吸器科	非小細胞癌	【CRT後】イミフィンジ	28	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CDDP+PEM (short hydration)	21	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				イジルド点滴静注 (25mg/V)	75	mg	1
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	75	mg/m ²	1
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CBDCA+PEM	21	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				イジルド点滴静注 (25mg/V)	75	mg	1
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CDDP or CBDCA+PEM 【維持療法 1~2回目】	56	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
				アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	29
				イジルド点滴静注 (25mg/V)	75	mg	29
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	29
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CDDP or CBDCA+PEM 【維持療法 3回目以降】	28	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CBDCA+nab-PTX	21	アブラキサン点滴静注用 (100mg/V)	100	mg/m ²	1
				イジルド点滴静注 (25mg/V)	75	mg	1
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				アブラキサン点滴静注用 (100mg/V)	100	mg/m ²	8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CBDCA+nab-PTX 【維持療法 1~2回目】	56	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
				イジルド点滴静注 (25mg/V)	75	mg	29
				イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	29
呼吸器科	非小細胞癌	イミフィンジ+イジリット®+CBDCA+nab-PTX 【維持療法 3回目以降】	28	イミフィンジ点滴静注 (500mg/V)	1500	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルダ®単剤	21	キイトルダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	パジール® (2週毎)+ヤーボイ	42	ヤーボイ点滴静注液 (20, 50mg/V)	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注 (2、4週用) (240mg/V)	240	mg	1, 15, 29
呼吸器科	非小細胞癌	パジール® (3週毎)+ヤーボイ	42	ヤーボイ点滴静注液 (20, 50mg/V)	1	mg/kg	1
				オブジーボ点滴静注 (3、6週用) (120, 240mg/V)	360	mg	1, 22
呼吸器科	非小細胞癌	パジール®+ヤーボイ+CBDCA+PEM	42	アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
				オブジーボ点滴静注 (3、6週用) (120, 240mg/V)	360	mg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ヤーボイ点滴静注液 (20, 50mg/V)	1	mg/kg	1
				アリムタ注射用 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	22
				オブジーボ点滴静注 (3、6週用) (120, 240mg/V)	360	mg	22
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	22

呼吸器科	非小細胞癌	ワ`ジ-ホ`+ヤ-ホ`イ+CBDCA+PEM【維持療法】	42	ヤーボイ点滴静注液(20, 50mg/V) オプジーボ点滴静注(3, 6週用)(120, 240mg/V)	1 360	mg/kg mg	1 1, 22
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルーダ`+CBDCA+PEM	21	アリムタ注射用(100, 500mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	500 5 200	mg/m ² AUC mg	1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルーダ`+CBDCA+PEM【維持療法】	21	アリムタ注射用(100, 500mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	500 200	mg/m ² mg	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	ワ`ジ-ホ`+ヤ-ホ`イ+CBDCA+PTX	42	オプジーボ点滴静注(3, 6週用)(120, 240mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V) ヤーボイ点滴静注液(20, 50mg/V) オプジーボ点滴静注(3, 6週用)(120, 240mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	360 6 200 1 360 6 200	mg AUC mg/m ² mg/kg mg AUC mg/m ²	1 1 1 1 22 22 22
呼吸器科	非小細胞癌	ワ`ジ-ホ`+ヤ-ホ`イ+CBDCA+PTX【維持療法】	42	ヤーボイ点滴静注液(20, 50mg/V) オプジーボ点滴静注(3, 6週用)(120, 240mg/V)	1 360	mg/kg mg	1 1, 22
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルーダ`+CBDCA+PTX	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	6 200 200	AUC mg mg/m ²	1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルーダ`+CBDCA+PTX(維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+PTX	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	6 200	AUC mg/m ²	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	【術後】CBDCA+PTX	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	6 200	AUC mg/m ²	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルーダ`+CBDCA+nab-PTX	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 6 200 100	mg/m ² AUC mg mg/m ²	1 1 1 8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	キイトルーダ`+CBDCA+nab-PTX【維持療法】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク単剤(1コース目)	21	テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク単剤(2コース目以降)	21	テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	【術後】テセントリク(1コース目)	21	テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	【術後】テセントリク(2コース目以降)	21	テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+CBDCA+nab-PTX(1コース目)	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注(1200mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 6 1200 100	mg/m ² AUC mg mg/m ²	1 1 1 8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+CBDCA+nab-PTX(2コース目以降)	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注(1200mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 6 1200 100	mg/m ² AUC mg mg/m ²	1 1 1 8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+CBDCA+nab-PTX(維持療法)	21	テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+nab-PTX	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 6 100	mg/m ² AUC mg/m ²	1 1 8, 15
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+BEV+CBDCA+PTX(1コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注(1200mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	15 5 1200 175	mg/kg AUC mg mg/m ²	1 1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+BEV+CBDCA+PTX(2コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注(1200mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	15 5 1200 175	mg/kg AUC mg mg/m ²	1 1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+BEV+CBDCA+PTX(3コース以降)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) テセントリク点滴静注(1200mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	15 5 1200 175	mg/kg AUC mg mg/m ²	1 1 1 1

呼吸器科	非小細胞癌	テセントリク+BEV+CBDCA+PTX(維持療法)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V) テセントリク点滴静注(1200mg/V)	15 1200	mg/kg mg	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	【放射線併用】CBDCA+PTX	42	カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V) パクリタキセル注(30,100mg/V)	2 40	AUC mg/m ²	1,8,15,22,29,36 1,8,15,22,29,36
呼吸器科	非小細胞癌	【放射線併用】高齢者CBDCA	28	カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V)	30	mg/m ²	1~5,8~12,15~19,22~26
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+S-1	21	カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V) エスワンタイホウ配合0D錠	5 80	AUC mg/m ² (体表面積別)	1 1~14
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV(1コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V) アリムタ注射用(100,500mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V)	15 500 6	mg/kg mg/m ² AUC	1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV(2コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V) アリムタ注射用(100,500mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V)	15 500 6	mg/kg mg/m ² AUC	1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV(3コース目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V) アリムタ注射用(100,500mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V)	15 500 6	mg/kg mg/m ² AUC	1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV【維持療法】	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V) アリムタ注射用(100,500mg/V)	15 500	mg/kg mg/m ²	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	RAM+EGFR-TKI(1コース目)	14	サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	10	mg/kg	1
呼吸器科	非小細胞癌	RAM+EGFR-TKI(2コース目以降)	14	サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	10	mg/kg	1
呼吸器科	非小細胞癌	【術前術後】キイトルーダ [®] +CCDP+GEM【術前】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V) シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V) ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	200 1000 75 1000	mg mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 8
呼吸器科	非小細胞癌	【術前術後】キイトルーダ [®] +CCDP+GEM【術後】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	【術前術後】キイトルーダ [®] +CCDP+PEM【術前】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	500 200 75	mg/m ² mg mg/m ²	1 1 1
呼吸器科	非小細胞癌	【術前術後】キイトルーダ [®] +CCDP+PEM【術後】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
呼吸器科	非小細胞癌	タク [®] リッソ+CCDP+PEM	21	アリムタ注射用(100,500mg/V) シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	500 75	mg/m ² mg/m ²	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	タク [®] リッソ+CBDCA+PEM	21	アリムタ注射用(100,500mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50,150,450mg/V)	500 5	mg/m ² AUC	1 1
呼吸器科	非小細胞癌	タク [®] リッソ+PEM	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	Abraxane	21	アブラキサシン点滴静注用(100mg/V)	260	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	Eribulin	21	ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4	mg/m ²	1,8
乳腺外科	乳がん	Eribulin【2週毎】	28	ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4	mg/m ²	1,15
乳腺外科	乳がん	Vinorelbine	21	ロセウス静注液(40mg/V)	25	mg/m ²	1,8
乳腺外科	乳がん	weekly PTX	7	パクリタキセル注(30,100mg/V)	80	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	tri-weeklyDTX75	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V)	75 600	mg/m ² mg/m ²	1 1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ【初回(ロ-ディングド-ーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V) ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V)	8 75 600	mg/kg mg/m ² mg/m ²	1 1 1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V) ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V)	6 75 600	mg/kg mg/m ² mg/m ²	1 1 1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ+DTX【初回(ロ-ディングド-ーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V) ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	8 75 840	mg/kg mg/m ² mg	1 1 1
乳腺外科	乳がん	フェスコ [®] IN+DTX【初回(ロ-ディングド-ーズ)】	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V) フェスコ配合皮下注IN	75 1	mg/m ² V	1 1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ+DTX(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V) ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	6 75 420	mg/kg mg/m ² mg	1 1 1
乳腺外科	乳がん	フェスコ [®] MA+DTX【2コース以降】	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75	mg/m ²	1

乳腺外科	乳がん	Bmab+PTX(1コース目)	28	フェスゴ配合皮下注MA アバステン点滴静注用(100, 400mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V) アバステン点滴静注用(100, 400mg/V)	1 10 90 10	V mg/kg mg/m ² mg/kg	1 1 1, 8, 15 15
乳腺外科	乳がん	Bmab+PTX(2コース目以降)	28	アバステン点滴静注用(100, 400mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	10 90	mg/kg mg/m ²	1, 15 1, 8, 15
乳腺外科	乳がん	Bmab+nabPTX(1コース目)	28	アバステン点滴静注用(100, 400mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V) アバステン点滴静注用(100, 400mg/V)	10 100 10	mg/kg mg/m ² mg/kg	1 1, 8, 15 15
乳腺外科	乳がん	Bmab+nabPTX(2コース目以降)	28	アバステン点滴静注用(100, 400mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	10 100	mg/kg mg/m ²	1, 15 1, 8, 15
乳腺外科	乳がん	EC	21	エビルピシン注射用(10, 50mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V)	90 600	mg/m ² mg/m ²	1 1
乳腺外科	乳がん	dd EC	14	エビルピシン注射用(10, 50mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V)	90 600	mg/m ² mg/m ²	1 1
乳腺外科	乳がん	TEC+Abraxane(1コース目)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) テセントリク点滴静注(840mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V) テセントリク点滴静注(840mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 840 100 840 100	mg/m ² mg mg/m ² mg mg/m ²	1 1 15 15 8
乳腺外科	乳がん	TEC+Abraxane(2コース目以降)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) テセントリク点滴静注(840mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V) テセントリク点滴静注(840mg/V) アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 840 100 840 100	mg/m ² mg mg/m ² mg mg/m ²	1 1 15 15 8
乳腺外科	乳がん	Adjuvantトラスツズマブ【初回(ロディングドーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	8	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	Adjuvantトラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V)	6	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ【初回(ロディングドーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	8 840	mg/kg mg	1 1
乳腺外科	乳がん	フェスゴIN【初回(ロディングドーズ)】	21	フェスゴ配合皮下注IN	1	V	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ【2コース以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	6 420	mg/kg mg	1 1
乳腺外科	乳がん	フェスゴMA【2コース以降】	21	フェスゴ配合皮下注MA	1	V	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)HP【初回(ロディングドーズ)】	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	6 8 75 840	AUC mg/kg mg/m ² mg	1 1 1 1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)+フェスゴIN【初回(ロディングドーズ)】	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V) フェスゴ配合皮下注IN	6 75 1	AUC mg/m ² V	1 1 1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)HP(2コース以降)	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	6 6 75 420	AUC mg/kg mg/m ² mg	1 1 1 1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)+フェスゴMA【2コース以降】	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V) フェスゴ配合皮下注MA	6 75 1	AUC mg/m ² V	1 1 1
乳腺外科	乳がん	w-PTX+パージェタ+トラスツズマブ【初回(ロディングドーズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	8 840 80	mg/kg mg mg/m ²	1 1 1, 8, 15
乳腺外科	乳がん	w-PTX+フェスゴIN【初回(ロディングドーズ)】	21	フェスゴ配合皮下注IN パクリタキセル注(30, 100mg/V)	1 80	V mg/m ²	1 1, 8, 15
乳腺外科	乳がん	w-PTX+パージェタ+トラスツズマブ【2コース以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V) パクリタキセル注(30, 100mg/V)	6 420 80	mg/kg mg mg/m ²	1 1 1, 8, 15
乳腺外科	乳がん	w-PTX+フェスゴMA【2コース以降】	21	フェスゴ配合皮下注MA パクリタキセル注(30, 100mg/V)	1 80	V mg/m ²	1 1, 8, 15

乳腺外科	乳がん	アブラキサン+パージェタ+トラスツズマブ【初回(0-ディングト-ズ)】	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	260 8 840	mg/m ² mg/kg mg	1 1 1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+フェスコ IN	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) フェスコ配合皮下注IN	260 1	mg/m ² V	1 1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+パージェタ+トラスツズマブ【2コース以降】	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V)	260 6 420	mg/m ² mg/kg mg	1 1 1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン+フェスコ MA	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) フェスコ配合皮下注MA	260 1	mg/m ² V	1 1
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+パージェタ+トラスツズマブ【初回(0-ディングト-ズ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V) ハラヴェン静注(1mg/V)	8 840 1.4	mg/kg mg mg/m ²	1 1 1.8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+フェスコ IN【初回(0-ディングト-ズ)】	21	フェスコ配合皮下注IN ハラヴェン静注(1mg/V)	1 1.4	V mg/m ²	1 1.8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+パージェタ+トラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60, 150mg/V) パージェタ点滴静注(420mg/V) ハラヴェン静注(1mg/V)	6 420 1.4	mg/kg mg mg/m ²	1 1 1.8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン+フェスコ MA【2コース以降】	21	フェスコ配合皮下注MA ハラヴェン静注(1mg/V)	1 1.4	V mg/m ²	1 1.8
乳腺外科	乳がん	カドサイラ(初回)	21	カドサイラ(100, 160mg/V)	3.6	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	カドサイラ(2コース以降)	21	カドサイラ(100, 160mg/V)	3.6	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	エンハーツ(初回)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	5.4	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	エンハーツ(2コース以降)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	5.4	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	ベムゾリス マブ +GEM+CBDCA	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) ゲムシタピン点滴静注用(200mg, 1g/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) ゲムシタピン点滴静注用(200mg, 1g/V)	2 200 1000 2 1000	AUC mg mg/m ² AUC mg/m ²	1 1 1 8 8
乳腺外科	乳がん	ベムゾリス マブ +PTX【2剤併用】	7	キイトルーダ点滴静注(100mg/V) バクリタキセル注(30, 100mg/V)	200 90	mg mg/m ²	1 1
乳腺外科	乳がん	ベムゾリス マブ +PTX【PTX単剤】	7	バクリタキセル注(30, 100mg/V)	90	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	ベムゾリス マブ +nabPTX【2剤併用】	7	アブラキサン点滴静注用(100mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	100 200	mg/m ² mg	1 1
乳腺外科	乳がん	ベムゾリス マブ +nabPTX【nabPTX単剤】	7	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100	mg/m ²	1
乳腺外科	乳がん	ベムゾリス マブ 単剤【PTX or nabPTX併用】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
乳腺外科	乳がん	EC+キイトルーダ	21	エビルピシン注射用(10, 50mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V)	90 200 600	mg/m ² mg mg/m ²	1 1 1
乳腺外科	乳がん	PTX+CBDCA+キイトルーダ【CBDCA3週毎】	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) バクリタキセル注(30, 100mg/V) バクリタキセル注(30, 100mg/V)	5 200 80 80	AUC mg mg/m ² mg/m ²	1 1 1 8.15
乳腺外科	乳がん	PTX+CBDCA+キイトルーダ【CBDCA1週毎】	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) キイトルーダ点滴静注(100mg/V) バクリタキセル注(30, 100mg/V) カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V) バクリタキセル注(30, 100mg/V)	1.5 200 80 1.5 80	AUC mg mg/m ² AUC mg/m ²	1 1 1 8.15 8.15
乳腺外科	乳がん	キイトルーダ(術後化学療法)【3週毎】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
乳腺外科	乳がん	キイトルーダ(術後化学療法)【6週毎】	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400	mg	1
乳腺外科	乳がん	トロデルビ(1コース目)	21	トロデルビ点滴静注用(200mg/V)	10	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	トロデルビ(2コース目以降)	21	トロデルビ点滴静注用(200mg/V)	10	mg/kg	8
乳腺外科	乳がん	ダトロウェイ(1コース目)	21	ダトロウェイ点滴静注用(100mg/V)	10	mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	ダトロウェイ(2コース目以降)	21	ダトロウェイ点滴静注用(100mg/V)	6	mg/kg	1
泌尿器科	移行上皮癌	GC	28	ゲムシタピン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1

				シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	70	mg/m ²	2
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	8, 15
泌尿器科	移行上皮癌	Gcarbo	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	4. 5	AUC	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	8
泌尿器科	移行上皮癌	GN療法	28	ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1, 8, 15
				アクトラ静注用(10, 50, 100mg/V)	70	mg/m ²	2
泌尿器科	移行上皮癌	GP	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	200	mg/m ²	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	8, 15
泌尿器科	移行上皮癌	ベムプロリズマブ(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	ベムプロリズマブ(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400	mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	Avelumab	14	バベンチオ点滴静注(200mg/V)	10	mg/kg	1
泌尿器科	移行上皮癌	インヒター・ヘドチン療法	28	バドセブ点滴静注(20, 30mg/V)	1. 25	mg/kg	1, 8, 15
泌尿器科	移行上皮癌	Adjuvant Nivo(2週毎)	14	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	240	mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	Adjuvant Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	480	mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	キイトルーダ・バドセブ療法	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
				バドセブ点滴静注(20, 30mg/V)	1. 25	mg/kg	1, 8
泌尿器科	小細胞癌(泌尿器)	CE	28	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	1
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	2~3
泌尿器科	腎がん	トーリセル	7	トーリセル点滴静注液(25mg/V)	25	mg	1
泌尿器科	腎がん	Ipi+Nivo	21	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	240	mg	1
				ヤーボイ点滴静注液(20, 50mg/V)	1	mg/kg	1
泌尿器科	腎がん	Ipi+Nivo(Nivo単独)	14	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	240	mg	1
泌尿器科	腎がん	Nivo(2週毎)	14	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	240	mg	1
泌尿器科	腎がん	Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2, 4週用)(240mg/V)	480	mg	1
泌尿器科	腎がん	Avelumab+Axitinib	14	バベンチオ点滴静注(200mg/V)	10	mg/kg	1
泌尿器科	腎がん	Adjuvant PEM(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
泌尿器科	腎がん	Adjuvant PEM(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400	mg	1
泌尿器科	腎がん	Pembrolizumab+Axitinib	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
泌尿器科	腎がん	PEM+LEN(ベムプロリズマブ+レンバチニブ)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
泌尿器科	精巣腫瘍	BEP	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	20	mg/m ²	1
				ブレオ注射用(5mg/V)	30	mg	1
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	1
				シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	20	mg/m ²	2~5
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	2~5
				ブレオ注射用(5mg/V)	30	mg	8, 15
泌尿器科	精巣腫瘍	TIN療法	21	パクリタキセル注(30, 100mg/V)	210	mg/m ²	1
				アクトラ静注用(10, 50, 100mg/V)	100	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400	mg	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1200	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400	mg	3~6
				注射用イホマイド(1g/V)	1200	mg/m ²	3~6
泌尿器科	前立腺癌	Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V)	75	mg/m ²	1
泌尿器科	前立腺癌	カバジタキセル	21	ジェブタナ点滴静注(60mg/V)	25	mg/m ²	1
泌尿器科	膀胱内注入	MMC膀胱内注入	7	マイトマイシン注用(2, 10mg/V)	20	mg	1
泌尿器科	膀胱内注入	T H P膀胱内注入	7	テラルビシン注射用(膀胱内注入用)	30	mg	1
産婦人科	その他(婦人科)	AI療法	21	ウロミテキサン注(400mg/V)	400	mg	1
				ドキソルビシン(10, 50mg/V)	20	mg/m ²	1
				注射用イホマイド(1g/V)	2000	mg/m ²	1
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400	mg	2~3
				ドキソルビシン(10, 50mg/V)	20	mg/m ²	2~3
				注射用イホマイド(1g/V)	2000	mg/m ²	2~3
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400	mg	4~5
				注射用イホマイド(1g/V)	2000	mg/m ²	4~5
産婦人科	その他(婦人科)	ヨンデリス	21	ヨンデリス点滴静注用(1mg/V)	1. 2	mg/m ²	1

産婦人科	その他(婦人科)	Eribulin	21	ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4	mg/m ²	1.8
産婦人科	子宮体癌	TC	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	180	mg/m ²	1
産婦人科	子宮体癌	AP	21	シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				ドキシルビシン(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
産婦人科	子宮体癌	ベムプロリズマブ	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
産婦人科	子宮体癌	PEM+LEN(ベムプロリズマブ+レンバチニブ)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
産婦人科	子宮体癌	PEM【6週毎】+LEN(ベムプロリズマブ+レンバチニブ)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400	mg	1
産婦人科	子宮体癌	DP	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
				ドセタキセル点滴静注(20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	子宮体癌	CPA	21	注射用エンドキサン(500mg/V)	15	mg/kg	1
産婦人科	子宮頸癌	TC	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	180	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+RT(CCRT)	7	シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	40	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM(3週毎、CDDP+RTと併用→終了後は単剤)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM(6週毎、CDDP+RTと併用→終了後は単剤)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400	mg	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(1コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(2コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(3コース目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)(10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	TP0+PTX+Bev(1コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				ハイカムチン注射用(1, 1mg/V)	0.75	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
				ハイカムチン注射用(1, 1mg/V)	0.75	mg/m ²	2~3
産婦人科	子宮頸癌	TP0+PTX+Bev(2コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				ハイカムチン注射用(1, 1mg/V)	0.75	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
				ハイカムチン注射用(1, 1mg/V)	0.75	mg/m ²	2~3
産婦人科	子宮頸癌	TP0+PTX+Bev(3コース目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				ハイカムチン注射用(1, 1mg/V)	0.75	mg/m ²	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
				ハイカムチン注射用(1, 1mg/V)	0.75	mg/m ²	2~3
産婦人科	子宮頸癌	PE(CDDP+ETP)【小細胞がん】	21	シスプラチン注(500ml)(10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	1~3
産婦人科	子宮頸癌	CPT-11単剤	28	イリノテカン点滴静注(40, 100mg/V)	100	mg/m ²	1, 8, 15
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(1コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(2コース目)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(3コース目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(PEM+Bev維持療法)	21	アバスチン点滴静注用(100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC	21	カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200	mg	1
				パクリタキセル注(30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1

産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC (PEM維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev (1コース目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
				シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev (2コース目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
				シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev (3コース目以降)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
				シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev (PEM+Bev維持療法)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
				シスプラチン注 (250ml) (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP (PEM維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
産婦人科	卵巣癌	WeeklyTC	28	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	1.5	AUC	1, 8, 15
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 8, 15
産婦人科	卵巣癌	ddTC	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 8, 15
産婦人科	卵巣癌	TC	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	180	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	weekly GEM	28	ゲムシタビン点滴静注用 (200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1, 8, 15
産婦人科	卵巣癌	DTX	21	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	wIP	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	60	mg/m ²	1
				イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60	mg/m ²	8, 15
産婦人科	卵巣癌	脱感作:wIP	28	イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (脱感作 生食200) (10, 50mg/V)	54	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (脱感作用) (10, 50mg/V)	0.54	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (脱感作用) (10, 50mg/V)	5.4	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (脱感作用) (10, 50mg/V)	0.054	mg/m ²	1
				イリノテカン点滴静注 (40, 100mg/V)	60	mg/m ²	8, 15
産婦人科	卵巣癌	Doxil	28	ドキシル注 (20mg/V)	40	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev (Bev1回目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev (Bev2回目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev (Bev3回目以降)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	Bev maintenance	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
産婦人科	卵巣癌	Weekly PTX+Bev (Bev初回)	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 8, 15, 22
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	Weekly PTX+Bev (Bev3回目以降)	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 15
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 8, 15, 22
産婦人科	卵巣癌	脱感作: TC+Bev	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.45	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.005	AUC	1

				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.045	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	4.5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	175	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	脱感作：DC+Bev	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.045	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.45	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	4.5	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.005	AUC	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev (Bev1回目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev (Bev2回目)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev (Bev3回目以降)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	70	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	PLD+CBDCA	28	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドキシル注 (20mg/V)	30	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	脱感作：PLD+CBDCA	28	カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.45	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.005	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	4.5	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.045	AUC	1
				ドキシル注 (20mg/V)	30	mg/m ²	1
産婦人科	卵巣癌	PLD-C+Bev (1ｺｰｽ目)	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドキシル注 (20mg/V)	30	mg/m ²	1
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	PLD-C+Bev (2ｺｰｽ目以降)	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドキシル注 (20mg/V)	30	mg/m ²	1
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	脱感作：PLD-C+Bev (1ｺｰｽ目)	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.005	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.45	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	4.5	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.045	AUC	1
				ドキシル注 (20mg/V)	30	mg/m ²	1
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	脱感作：PLD-C+Bev (2ｺｰｽ目以降)	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.45	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.005	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	4.5	AUC	1
				カルボプラチン点滴静注液 (250ml) (50, 150, 450mg/V)	0.045	AUC	1
				ドキシル注 (20mg/V)	30	mg/m ²	1
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	TP0	21	ハイカムチン注射用 (1, 1mg/V)	1.5	mg/m ²	1～5
産婦人科	卵巣癌	PLD+Bev 1ｺｰｽ目	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				ドキシル注 (20mg/V)	40	mg/m ²	1
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	PLD+Bev 2ｺｰｽ目以降	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				ドキシル注 (20mg/V)	40	mg/m ²	1
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	BEP療法 (悪性卵巣胚細胞腫瘍)	21	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	20	mg/m ²	1
				ブレオ注射用 (5mg/V)	30	mg	1
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1

				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	20	mg/m ²	2～5
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	2～5
				ブレオ注射用 (5mg/V)	30	mg	8, 15
産婦人科	絨毛性疾患	MTX 5-Day	5	注射用メソトレキセート (50mg/V)	0. 4	mg/kg	1～5
産婦人科	絨毛性疾患	MTX-FA	8	注射用メソトレキセート (50mg/V)	1	mg/kg	1, 3, 5, 7
産婦人科	絨毛性疾患	Act-D単剤	14	コスメゲン静注用 (0. 5mg/V)	0. 01	mg/kg	1～5
産婦人科	絨毛性疾患	MEA療法	21	コスメゲン静注用 (0. 5mg/V)	0. 5	mg	1
				メソトレキセート点滴静注液 (MEA用) (50mg/V)	150	mg	1
				メソトレキセート点滴静注液 (MEA用) (50mg/V)	300	mg	1
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg	1
				コスメゲン静注用 (0. 5mg/V)	0. 5	mg	2～5
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg	2～5
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ドセタキセル	28	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	25	mg/m ²	1, 8, 15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	S-1&Docetaxel併用療法	21	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	40	mg/m ²	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80	mg/m ² (体表面積別)	1～14
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	頭頸部 CF	28	5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	2～5
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	2～6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+CF (1コース目)	21	5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V)	400	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	2～4
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	2～5
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	8, 15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+CF (2コース目以降)	21	5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	2～4
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	400	mg/m ²	2～5
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	8, 15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab維持	7	アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CDDP+RT	49	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1, 22, 43
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ドセタキセル+RT	42	ドセタキセル点滴静注 (20, 80mg/V)	10	mg/m ²	1, 8, 15, 22, 29, 36
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+RT	56	アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V)	400	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	8, 15, 22, 29, 36, 43, 50
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCa+RT	7	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	1. 5	AUC	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF	21	5-FU注 (250, 1000mg/V)	187. 5	mg/m ²	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	75	mg/m ²	1
				ドセタキセル (20, 80mg/V)	60	mg/m ²	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	187. 5	mg/m ²	2～5
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	187. 5	mg/m ²	2～6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF (CBDCa)	21	5-FU注 (250, 1000mg/V)	187. 5	mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ドセタキセル (20, 80mg/V)	60	mg/m ²	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	187. 5	mg/m ²	2～5
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	187. 5	mg/m ²	2～6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ニボルマブ	14	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PCE (1コース)	21	アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V)	400	mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	2. 5	AUC	1
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	100	mg/m ²	1
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	15
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	8
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	2. 5	AUC	8
				パクリタキセル注 (30, 100mg/V)	100	mg/m ²	8
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PCE (2コース以降)	21	アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	1, 8
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	2. 5	AUC	1, 8

				バクリタキセル注 (30, 100mg/V)	100	mg/m ²	1, 8
				アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+5-FU	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	1000	mg/m ²	1~4
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PTX+Cmab (1コース目)	7	アービタックス注射液 (500ml) (100, 500mg/V)	400	mg/m ²	1
				バクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PTX+Cmab (2コース目以降)	7	アービタックス注射液 (250ml) (100, 500mg/V)	250	mg/m ²	1
				バクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Weekly PTX	49	バクリタキセル注 (30, 100mg/V)	80	mg/m ²	1, 8, 15, 22, 29, 36
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	FP+キイトルーダ	21	5-FU注 (250, 1000mg/V)	800	mg/m ²	1
				キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
				シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	80	mg/m ²	1
				5-FU注 (250, 1000mg/V)	800	mg/m ²	2~4
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	FP+キイトルーダ【キイトルーダ維持療法】	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ (放射線併用期)	70	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				テモダールカプセル	75	mg/m ² (体表面積別)	1~42
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	15
				アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	29, 42
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ (維持療法期) : 1コース目	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 15
				テモダールカプセル	150	mg/m ² (体表面積別)	1~5
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ (維持療法期) : 2コース目以降	28	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 15
				テモダールカプセル	150	mg/m ² (体表面積別)	1~5
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン (単剤療法期)	21	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	15	mg/kg	1
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン (再発)	14	アバスチン点滴静注用 (100, 400mg/V)	10	mg/kg	1
脳神経外科	中枢神経悪性リンパ腫	R-MPV	14	リツキサン注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
				オンコビン注射用 (1mg/V)	1.4	mg/m ²	2
				メソトレキセート点滴静注液 (500ml) (5, 50, 200, 1000mg/	3500	mg/m ²	2
				プロカルバジン	100	mg/m ² (体表面積別)	2~8
				ロイコボリン注3mg	30	mg	3
				ロイコボリン注3mg	30	mg	4
				ロイコボリン注3mg	30	mg	5
				ロイコボリン注3mg	15	mg	5
				ロイコボリン注3mg	15	mg	6
脳神経外科	中枢神経悪性リンパ腫	HD-AraC	28	キロサイド (シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	3000	mg/m ²	1~2
化学療法	その他	ゾメタ点滴	21	ゾメタ点滴静注	4	mg	1
化学療法	その他	ゾラデックスLA	84	ゾラデックスLA10.8mgデポ	1	筒	1
化学療法	その他	フェソロデックス筋注 (3回目まで)	56	フェソロデックス筋注 250mg	2	筒	1, 15, 29
化学療法	その他	フェソロデックス筋注 (4回目以降)	28	フェソロデックス筋注 250mg	2	筒	1
化学療法	その他	アクテムラ (整形)	28	アクテムラ点滴静注 (200mg/V)	8	mg/kg	1
化学療法	非がん	リツキシマブ 通常 (濃度) 【ITP】	7	リツキシマブBS注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
化学療法	非がん	リツキシマブ 4倍濃縮 【ITP】	7	リツキシマブBS注 (2.5倍希釈) (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
化学療法	非がん	リツキシマブ 通常 (濃度) 【ITP】	7	リツキシマブBS注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
化学療法	非がん	リツキシマブ 通常 (濃度) 【ANCA関連血管炎】	7	リツキシマブBS注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
化学療法	非がん	シクロフォスファミド (全身性血管炎)	28	注射用エンドキサン (500mg/V)	500	mg/m ²	1
化学療法	非がん	川崎病 レミケード (25kg未満)	1	レミケード点滴静注用 (100mg/V)	5	mg/kg	1
化学療法	非がん	川崎病 レミケード (25kg以上)	2	レミケード点滴静注用 (100mg/V)	5	mg/kg	1
眼科	その他 (眼科)	眼科レミケード (導入)	99	レミケード点滴静注用 (100mg/V)	5	mg/kg	1, 15, 43
眼科	その他 (眼科)	眼科レミケード (維持)	56	レミケード点滴静注用 (100mg/V)	5	mg/kg	1
整形外科	関節リウマチ	整形レミケード (導入)	98	レミケード点滴静注用 (100mg/V)	3	mg/kg	1, 15, 43
整形外科	関節リウマチ	整形レミケード6週以降	56	レミケード点滴静注用 (100mg/V)	3	mg/kg	1
血液内科	その他 (血内)	アクテムラ	14	アクテムラ点滴静注 (200mg/V)	8	mg/kg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	ICE (4分割)		ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1~2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	1250	mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	2
				注射用イホマイド (1g/V)	1250	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	1250	mg/m ²	3

				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	3
				注射用イホマイド (1g/V)	1250	mg/m ²	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	ICE (5分割)		ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1~2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	1000	mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	2
				注射用イホマイド (1g/V)	1000	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	1000	mg/m ²	3
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	3
				注射用イホマイド (1g/V)	1000	mg/m ²	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	ICE (6分割)		ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1~2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	833.3	mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	2
				注射用イホマイド (1g/V)	833.3	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	833.3	mg/m ²	3
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	3
				注射用イホマイド (1g/V)	833.3	mg/m ²	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	LEED		ウロミテキサン注 (400mg/V)	24	mg/kg	1~2
				ラステット注 (100mg/V)	165	mg/m ²	1~2
				ラステット注 (100mg/V)	170	mg/m ²	1~2
				注射用エンドキサン (500mg/V)	60	mg/kg	1~2
				ラステット注 (100mg/V)	170	mg/m ²	3
				ラステット注 (100mg/V)	165	mg/m ²	3
				アルケラン静注用 (50mg/V)	65	mg/m ²	4
血液内科	ホジキンリンパ腫	エンドキサン単独		注射用エンドキサン (500mg/V)	500	mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	アドセトリス	21	アドセトリス点滴静注 (50mg/V)	1.8	mg/kg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	A+AVD	28	アドセトリス点滴静注 (50mg/V)	1.2	mg/kg	1, 15
				エクザール注射用 (10mg/V)	6	mg/m ²	1, 15
				ダカルバジン注用 (100mg/V)	375	mg/m ²	1, 15
				ドキシソルピシン (10, 50mg/V)	25	mg/m ²	1, 15
血液内科	ホジキンリンパ腫	A+AVd	28	アドセトリス点滴静注 (50mg/V)	1.2	mg/kg	1, 15
				エクザール注射用 (10mg/V)	6	mg/m ²	1, 15
				ダカルバジン注用 (100mg/V)	250	mg/m ²	1, 15
				ドキシソルピシン (10, 50mg/V)	25	mg/m ²	1, 15
血液内科	ホジキンリンパ腫	ABVD	28	エクザール注射用 (10mg/V)	6	mg/m ²	1, 15
				ダカルバジン注用 (100mg/V)	375	mg/m ²	1, 15
				ドキシソルピシン (10, 50mg/V)	25	mg/m ²	1, 15
				ブレオ注射用 (5mg/V)	10	mg/m ²	1, 15
血液内科	ホジキンリンパ腫	ABVd	28	エクザール注射用 (10mg/V)	6	mg/m ²	1, 15
				ダカルバジン注用 (100mg/V)	250	mg/m ²	1, 15
				ドキシソルピシン (10, 50mg/V)	25	mg/m ²	1, 15
				ブレオ注射用 (5mg/V)	10	mg/m ²	1, 15
血液内科	ホジキンリンパ腫	オブジーボ	14	オブジーボ点滴静注 (2, 4週用) (240mg/V)	240	mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	キイトルーダ	21	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	200	mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	キイトルーダ (6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注 (100mg/V)	400	mg	1
血液内科	ALL/CLL	エンドキサン単独		注射用エンドキサン (500mg/V)	500	mg	1
血液内科	ALL/CLL	ALL213 BcellPh(-) 寛解導入45歳未満		オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	45	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	1200	mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	45	mg/m ²	2~3
				ロイナーゼ注用	5000	K. U. /m ²	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
				オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	8, 15, 22
				オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	1
血液内科	ALL/CLL	ALL213 BcellPh(-) 寛解導入45-60歳未満		ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	45	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	1200	mg/m ²	1
				ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	45	mg/m ²	2~3
				ロイナーゼ注用	5000	K. U. /m ²	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
				オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	8, 15, 22
				オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	1
				オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	1

血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 寛解導入60歳以上	オンコビン注射用(1mg/V) ダウノマイシン静注用(20mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V) ダウノマイシン静注用(20mg/V) ロイナーゼ注用 オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 30 800 30 3000 1.3	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1 1 1 2~3 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 8, 15, 22
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳未満(HD Ara-C phase) C 1 / C 4	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ラステット注(100mg/V) ロイナーゼ注用	2000 100 10000	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ²	1~3 1~3 4
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳未満(HD Ara-C phase) C 1 / C 4 【im_L-ASP】	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ラステット注(100mg/V) ロイナーゼ筋注用	2000 100 10000	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ²	1~3 1~3 4
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳以上(HD Ara-C phase) C 1 / C 4	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ラステット注(100mg/V) ロイナーゼ注用	1000 100 5000	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ²	1~3 1~3 4
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳以上(HD Ara-C phase) C 1 / C 4 【im_L-ASP】	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ラステット注(100mg/V) ロイナーゼ筋注用	1000 100 5000	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ²	1~3 1~3 4
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳未満(HD MTX phase) C 2 / C 5	オンコビン注射用(1mg/V) メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg ロイナーゼ注用 ロイコボリン注3mg	1.3 3000 51 15 10000 15	mg/m ² mg/m ² mg mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1, 15 1, 15 2, 16 3, 17 3, 17 3~4, 17~18
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳未満(HD MTX phase) C 2 / C 5 【im_L-ASP】	オンコビン注射用(1mg/V) メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg ロイナーゼ筋注用 ロイコボリン注3mg	1.3 3000 51 15 10000 15	mg/m ² mg/m ² mg mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1, 15 1, 15 2, 16 3, 17 3, 17 3~4, 17~18
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳以上・60歳未満(HD MTX phase) C 2 / C 5	オンコビン注射用(1mg/V) メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg ロイナーゼ注用 ロイコボリン注3mg	1.3 1500 51 15 10000 15	mg/m ² mg/m ² mg mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1, 15 1, 15 2, 16 3, 17 3, 17 3~4, 17~18
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳以上(HD MTX phase) C 2 / C 5	オンコビン注射用(1mg/V) メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg ロイナーゼ注用 ロイコボリン注3mg	1.3 1500 51 15 5000 15	mg/m ² mg/m ² mg mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1, 15 1, 15 2, 16 3, 17 3, 17 3~4, 17~18
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳未満 C 3	オンコビン注射用(1mg/V) ダウノマイシン静注用(20mg/V) ロイナーゼ注用 キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) 注射用エンドキサン(500mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	1.3 45 5000 75 1200 75 75	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15 2, 4, 6, 9, 11, 13 29 29 30~33 36~40
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Bcell IPh(-) 地固め60歳以上 C 3	オンコビン注射用(1mg/V) ダウノマイシン静注用(20mg/V) ロイナーゼ注用 キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) 注射用エンドキサン(500mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	1.3 30 3000 75 800 75 75	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15 2, 4, 6, 9, 11, 13 29 29 30~33 36~40

血液内科	ALL/CLL	ALL213 BcellPh(-) 地固め60歳未満 C 3 【im_L-ASP】		オンコビン注射用 (1mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) ロイナーゼ筋注用 キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) 注射用エンドキサン (500mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	1.3 45 5000 75 1200 75 75	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15 2, 4, 6, 9, 11, 13 29 29 30~33 36~40
血液内科	ALL/CLL	ALL213 BcellPh(-) 地固め60歳以上 C 3 【im_L-ASP】		オンコビン注射用 (1mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) ロイナーゼ筋注用 キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) 注射用エンドキサン (500mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	1.3 30 3000 75 800 75 75	mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15 2, 4, 6, 9, 11, 13 29 29 30~33 36~40
血液内科	ALL/CLL	ALL213 BcellPh(-) 維持療法	28	オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	1
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Tcell-I-0 60歳未満 寛解導入療法		オンコビン注射用 (1mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) 注射用エンドキサン (500mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) ロイナーゼ注用 オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3 45 1200 45 5000 1.3	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1 1 1 2~3 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 8, 15, 22
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Tcell-I-0 60歳未満 寛解導入療法 【im_L-ASP】		オンコビン注射用 (1mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) 注射用エンドキサン (500mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) ロイナーゼ筋注用 オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3 45 1200 45 5000 1.3	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² K. U. /m ² mg/m ²	1 1 1 2~3 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 8, 15, 22
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Tcell-I-0 地固め C1/C4		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ラストット注 (100mg/V)	2000 100	mg/m ² mg/m ²	1~3 1~3
血液内科	ALL/CLL	ALL213 Tcell-I-0 地固め C3 45歳未満		オンコビン注射用 (1mg/V) ドキシソルビン (10, 50mg/V) アラノンジー静注用 (250mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) 注射用エンドキサン (500mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	1.3 30 1500 75 1200 75	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1, 8, 15 1, 8, 15 29, 31, 33 36 36 37~40, 43~47
血液内科	ALL/CLL	ALL213Ph+DAS強化地固め療法		オンコビン注射用 (1mg/V) 注射用エンドキサン (500mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3 1200 45 1.3	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1~3 8, 15, 22
血液内科	ALL/CLL	ALL213Ph+DAS C1		メソトレキセート点滴静注液 (5, 50, 200, 1000mg/V) メソトレキセート点滴静注液 (5, 50, 200, 1000mg/V) キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ロイコポリン注3mg キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本) ロイコポリン注3mg ロイコポリン注3mg	100 900 2000 15 2000 15 15	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg mg/m ² mg mg	1 1 2 2 3 3 4
血液内科	ALL/CLL	ALL213Ph+DAS C2		オンコビン注射用 (1mg/V) ダウノマイシン静注用 (20mg/V) 注射用エンドキサン (500mg/V)	1.3 45 1200	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1
血液内科	ALL/CLL	ALL213Ph+DAS 維持	35	オンコビン注射用 (1mg/V)	1.3	mg/m ²	1
血液内科	ALL/CLL	ベスボンサ (1コ-5目)	21	ベスボンサ点滴静注用 (1mg/V)	0.8	mg/m ²	1
血液内科	ALL/CLL	ベスボンサ 非寛解 (2コ-5目以降)	28	ベスボンサ点滴静注用 (1mg/V)	0.5	mg/m ²	8, 15
血液内科	ALL/CLL	ベスボンサ 寛解後 (2コ-5目以降)	28	ベスボンサ点滴静注用 (1mg/V)	0.8 0.5	mg/m ² mg/m ²	1 8, 15
血液内科	ALL/CLL	ベスボンサ 寛解後 (2コ-5目以降)	28	ベスボンサ点滴静注用 (1mg/V)	0.5	mg/m ²	1, 8, 15
血液内科	ALL/CLL	ビーリンサイト 1コ-5目 (45kg以上)	42	ビーリンサイト点滴静注用 (35 μg/V) ビーリンサイト点滴静注用 (35 μg/V)	31.5 98	μg μg	1~7 8~28

血液内科	ALL/CLL	ビーリンサイト 2～5コース目 (45kg以上)	42	ビーリンサイト点滴静注用 (35 μ g/V)	98	μ g	1～28
血液内科	ALL/CLL	ビーリンサイト 6～9コース目 (45kg以上)	84	ビーリンサイト点滴静注用 (35 μ g/V)	98	μ g	1～28
血液内科	ALL/CLL	CLL RiT 通常(濃度) 500mg/m ² 【2コース目以降】	7	リツキサン注 (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
血液内科	ALL/CLL	CLL RiT 4倍濃縮 500mg/m ² 【2コース目以降】	7	リツキサン注 (2.5倍希釈) (100, 500mg/V)	500	mg/m ²	1
血液内科	AML/MDS	AML201 DNR-AraC	14	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	100	mg/m ²	1～5
				ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	50	mg/m ²	1～5
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	100	mg/m ²	6～7
血液内科	AML/MDS	AML201 IDR-AraC	14	イダマイシン静注用 (5mg/V)	12	mg/m ²	1～3
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	100	mg/m ²	1～3
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	100	mg/m ²	4～7
血液内科	AML/MDS	AML201 維持療法 HD-AraC	28	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	2000	mg/m ²	1～5
血液内科	AML/MDS	AML201 維持 (D1) MIT-AraC		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	200	mg/m ²	1～3
				ノバントロン注 (10mg/V)	7	mg/m ²	1～3
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	200	mg/m ²	4～5
血液内科	AML/MDS	AML201 維持 (D2) DNR-AraC		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	200	mg/m ²	1～3
				ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	50	mg/m ²	1～3
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	200	mg/m ²	4～5
血液内科	AML/MDS	AML201 維持 (D3) ACR-AraC		アクラシノン注射用 (20mg/V)	20	mg/m ²	1～5
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	200	mg/m ²	1～5
血液内科	AML/MDS	AML201 維持 (D4) A triple V		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	200	mg/m ²	1～5
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1～5
				注射用フィルデシン (1, 3mg/V)	2	mg/m ²	10
				オンコビン注射用 (1mg/V)	0.8	mg/m ²	8
血液内科	AML/MDS	ビキセオス寛解導入療法	49	ビキセオス配合静注用 (100U/V)	100	単位/m ²	1, 3, 5
				ビキセオス配合静注用 (100U/V)	100	単位/m ²	15, 17
血液内科	AML/MDS	ビキセオス地固め療法	35	ビキセオス配合静注用 (100U/V)	65	単位/m ²	1, 3
血液内科	AML/MDS	GO	14	マイロターグ点滴静注用 (5mg/V)	9	mg/m ²	1
血液内科	AML/MDS	GML200 BHAC-DNR (70歳以上)	28	サンラビン点滴静注用 (200mg/V)	200	mg/m ²	1～3
				ダウノマイシン静注用 (20mg/V)	30	mg/m ²	1～3
				サンラビン点滴静注用 (200mg/V)	200	mg/m ²	4～8
血液内科	AML/MDS	JPLSG AML-12 HCEI		イダマイシン静注用 (5mg/V)	10	mg/m ²	1
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	3000	mg/m ²	1～3
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1～5
血液内科	AML/MDS	Vidaza (静注)	28	ビダーザ注射用 (静注) (100mg/V)	75	mg/m ²	1～7
血液内科	AML/MDS	Vidaza (皮下注)	28	ビダーザ注射用 (皮下注) (100mg/V)	75	mg/m ²	1～7
血液内科	AML/MDS	MDS200 CA (70歳未満)		アクラシノン注射用 (20mg/V)	14	mg/m ²	1～4
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	10	mg/m ²	1～14
血液内科	AML/MDS	MDS200 CA (70歳以上)		アクラシノン注射用 (20mg/V)	10	mg/m ²	1～4
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	10	mg/m ²	1～14
血液内科	AML/MDS	MDS200 CAG (70歳未満)		アクラシノン注射用 (20mg/V)	14	mg/m ²	1～4
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	10	mg/m ²	1～14
血液内科	AML/MDS	MDS200 CAG (70歳以上)		アクラシノン注射用 (20mg/V)	10	mg/m ²	1～4
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	10	mg/m ²	1～14
血液内科	AML/MDS	Low dose Ara-C		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	10	mg/m ²	1～14
血液内科	AML/MDS	Low dose Ara-C (ベネクトリス併用)	28	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	20	mg/m ²	1～10
血液内科	AML/MDS	CVG	28	キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	20	mg	1～14
				ラステット注 (100mg/V)	50	mg	1～14
血液内科	AML/MDS	MEC (変法)		ノバントロン注 (10mg/V)	6	mg/m ²	1～3
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	100	mg/m ²	1～7
				ラステット注 (100mg/V)	80	mg/m ²	1～7
血液内科	AML/MDS	E-CAG		ラステット注 (100mg/V)	30	mg/m ²	1～4
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	10	mg/m ²	1～14
				アクラシノン注射用 (20mg/V)	14	mg/m ²	5～8
血液内科	AML/MDS	FLAG-M		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	2000	mg/m ²	2～5
				フルダラ静注用 (50mg/V)	15	mg/m ²	2～5
				キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	2000	mg/m ²	3～6
				フルダラ静注用 (50mg/V)	15	mg/m ²	3～6

				ノバントロン注 (10mg/V)	10	mg/m ²	4~6
血液内科	急性前骨髄性白血病	(再発用) トリセノックス寛解導入		トリセノックス点滴静注 (12mg/A)	0.15	mg/kg	1~3
				トリセノックス点滴静注 (12mg/A)	0.15	mg/kg	4~60
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL212 C1/C3 ATO		トリセノックス点滴静注 (12mg/A)	0.15	mg/kg	1~5
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL212 C4 G0	14	マイロターグ点滴静注用 (5mg/V)	4	mg/m ²	1
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL205R BU-LPAM		ブスルフェクス点滴静注用 (60mg/V)	0.8	mg/kg	1~3
				アルケラン静注用 (50mg/V)	70	mg/m ²	4~5
血液内科	髄注	(i. t.) MTX-AraC-PSL		キロサイド(シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	40	mg	1
				注射用メソトレキセート (5, 50mg/V)	15	mg	1
血液内科	髄注	髄注JALSG202-0 Ph(-)		注射用メソトレキセート (5, 50mg/V)	15	mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	エンドキサン単独		注射用エンドキサン (500mg/V)	500	mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	VELCADE (週2回/3週サイクル)	21	ベルケイド注射用 (皮下注) (3mg/V)	1.3	mg/m ²	1, 4, 8, 11
血液内科	多発性骨髄腫	VELCADE (週1回/4週サイクル)	28	ベルケイド注射用 (皮下注) (3mg/V)	1.3	mg/m ²	1, 8, 15, 22
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】 (1コース目)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	20	mg/m ²	1~2
				カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	27	mg/m ²	8~9, 15~16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】 (2~12コース目)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	27	mg/m ²	1~2, 8~9, 15~16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】 (13コース以降)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	27	mg/m ²	1~2, 15~16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【Kd, IsaKd, DKd】 (1コース目)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	20	mg/m ²	1~2
				カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	56	mg/m ²	8~9, 15~16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【Kd, IsaKd, DKd】 (2コース以降)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	56	mg/m ²	1~2, 8~9, 15~16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス週1【Kd】 (1コース目)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	20	mg/m ²	1
				カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	70	mg/m ²	8, 15
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス週1【Kd】 (2コース以降)	28	カイプロリス点滴静注 (10, 40mg/V)	70	mg/m ²	1, 8, 15
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】 (1コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	15, 22
				エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】 (2コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 8, 15, 22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】 (1コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	15, 22
				エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】 (2コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 8, 15, 22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】 (1・2コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 8, 15, 22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】 (1・2コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 8, 15, 22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ2 (1コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1
				エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	15, 22
				エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ2 (2コース) [毎週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 8, 15, 22
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【ERd】 (3コース以降) [1回/2週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	10	mg/kg	1, 15
血液内科	多発性骨髄腫	エムブリシティ【EPd】 (3コース以降) [1回/4週: 4週サイクル]	28	エムブリシティ点滴静注 (300, 400mg/V)	20	mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	エンドキサン大量		ウロミテキサン注 (400mg/V)	800	mg/m ²	1~2
				注射用エンドキサン (500mg/V)	2000	mg/m ²	1~2
血液内科	多発性骨髄腫	大量L-PAM (200)		アルケラン静注用 (50mg/V)	100	mg/m ²	1~2
血液内科	多発性骨髄腫	サクリサ 10mg/kg (1コース目) 【IsaPd, IsaKd】	28	サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1
				サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	15, 22
				サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	サクリサ 10mg/kg (2コース目以降) 【IsaPd, IsaKd】	28	サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1, 15
血液内科	多発性骨髄腫	サクリサ 20mg/kg (1コース目) 【Isa-d, Isa単剤】	28	サクリサ点滴静注 (生食500ml) (100, 500mg/V)	20	mg/kg	1
				サクリサ点滴静注 (生食500ml) (100, 500mg/V)	20	mg/kg	15, 22
				サクリサ点滴静注 (生食500ml) (100, 500mg/V)	20	mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	サクリサ 20mg/kg (2コース目以降) 【Isa-d, Isa単剤】	28	サクリサ点滴静注 (生食500ml) (100, 500mg/V)	20	mg/kg	1, 15
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd (1コース目)	42	サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1
				ベルケイド注射用 (皮下注) (3mg/V)	1.3	mg/m ²	1, 4
				サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	15, 22, 29
				ベルケイド注射用 (皮下注) (3mg/V)	1.3	mg/m ²	22, 25, 29, 32
				サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	8
				ベルケイド注射用 (皮下注) (3mg/V)	1.3	mg/m ²	8, 11
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd (2~4コース目)	42	サクリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1, 15, 29

				ベルケイド注射用（皮下注）（3mg/V）	1.3	mg/m ²	1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd (5～17コース目)	28	サークリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1, 15
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd (18コース目以降)	28	サークリサ点滴静注 (100, 500mg/V)	10	mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	ダラキューロ	7	ダラキューロ配合皮下注	1800	mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	VTD-PACE	21	シスプラチン注 (10, 50mg/V)	10	mg/m ²	1～4
				ドキシソルビシン (10, 50mg/V)	10	mg/m ²	1～4
				ラステット注 (100mg/V)	40	mg/m ²	1～4
				注射用エンドキサン (500mg/V)	400	mg/m ²	1～4
血液内科	多発性骨髄腫	エルレフィオ皮下注 (ステップアップ 用量)	7	エルレフィオ皮下注 (44mg/V)	12	mg	1
				エルレフィオ皮下注 (44mg/V)	32	mg	4
血液内科	多発性骨髄腫	エルレフィオ皮下注 (標準用量)	7	エルレフィオ皮下注 (76mg/V)	76	mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	DCEP	21	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	10	mg/m ²	1～4
				ラステット注 (100mg/V)	40	mg/m ²	1～4
				注射用エンドキサン (500mg/V)	400	mg/m ²	1～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ (1コース目【1～3回目】)	7	ガザイバ点滴静注 (1000mg/V)	1000	mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ (2コース目以降)	21	ガザイバ点滴静注 (1000mg/V)	1000	mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ メンテナンス	56	ガザイバ点滴静注 (1000mg/V)	1000	mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT 通常 (濃度)	7	リツキサン注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT 4倍濃縮	7	リツキサン注 (2.5倍希釈) (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT メンテナンス 通常 (濃度)	7	リツキサン注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT メンテナンス 4倍濃縮	7	リツキサン注 (2.5倍希釈) (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_BS 通常 (濃度)	7	リツキシマブBS注 (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_BS 4倍濃縮	7	リツキシマブBS注 (2.5倍希釈) (100, 500mg/V)	375	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHOP	21	オンコビン注射用 (1mg/V)	1.4	mg/m ²	1
				ドキシソルビシン (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	750	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	Pola-CHP	21	ドキシソルビシン (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				ボライビー点滴静注用 (30, 140mg/V)	1.8	mg/kg	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	750	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	V(R)-CAP	21	ドキシソルビシン (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	750	mg/m ²	1
				ベルケイド注射用（皮下注）（3mg/V）	1.3	mg/m ²	1, 4, 8, 11
血液内科	非ホジキンリンパ腫	A+CHP	21	アドセトリス点滴静注 (50mg/V)	1.8	mg/kg	1
				ドキシソルビシン (10, 50mg/V)	50	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	750	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	THP-GOP	21	オンコビン注射用 (1mg/V)	1	mg/m ²	1
				テラルビシン注射用 (10, 20mg/V)	40	mg/m ²	1
				注射用エンドキサン (500mg/V)	650	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHASE	21	注射用エンドキサン (500mg/V)	1200	mg/m ²	1
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1～3
				キロサイド (シタラビン) (20, 200, 400, 1000mg/本)	2000	mg/m ²	2～3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DeVIC	21	ウロミテキサン注 (400mg/V)	300	mg/m ²	1
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	300	mg/m ²	1
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	300	mg/m ²	1～3
				注射用イホマイド (1g/V)	1500	mg/m ²	1～3
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	300	mg/m ²	2～3
				ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	2～3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	GCD	21	カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	1
				ゲムシタビン点滴静注用 (200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1, 8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	GDP	21	シスプラチン注 (500ml) (10, 50mg/V)	75	mg/m ²	1
				ゲムシタビン点滴静注用 (200mg, 1g/V)	1000	mg/m ²	1, 8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE (4分割)		ラステット注 (100mg/V)	100	mg/m ²	1～2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	1250	mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液 (50, 150, 450mg/V)	5	AUC	2
				注射用イホマイド (1g/V)	1250	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注 (400mg/V)	1250	mg/m ²	3

				ラステット注(100mg/V) 注射用イホマイド(1g/V)	100 1250	mg/m ² mg/m ²	3 3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE (5分割)		ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	1~2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1000	mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1000	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1000	mg/m ²	3
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE (6分割)		注射用イホマイド(1g/V)	1000	mg/m ²	3
				ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	1~2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	833. 3	mg/m ²	2
				カルボプラチン点滴静注液(50, 150, 450mg/V)	5	AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	833. 3	mg/m ²	2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	833. 3	mg/m ²	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(1・2段階増量)	21	ラステット注(100mg/V)	100	mg/m ²	3
				注射用イホマイド(1g/V)	833. 3	mg/m ²	3
				オンコビン注射用(1mg/V)	0. 4	mg/m ²	1~4
				ドキシソルビシン(10, 50mg/V)	10	mg/m ²	1~4
				ラステット注(100mg/V)	50	mg/m ²	1~4
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750	mg/m ²	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(3・4段階増量)	21	オンコビン注射用(1mg/V)	0. 4	mg/m ²	1~4
				ドキシソルビシン(10, 50mg/V)	14	mg/m ²	1~4
				ラステット注(100mg/V)	70	mg/m ²	1~4
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1050	mg/m ²	5
				トレアキシ点点滴静注液(100mg/V)	90	mg/m ²	1~2
				トレアキシ点点滴静注液(100mg/V)	120	mg/m ²	1~2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BENDA(90mg/m ²)【初発BR・Ibr+BR、初発・再発難治G-BENDA】	28	トレアキシ点点滴静注液(100mg/V)	90	mg/m ²	1~2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BENDA(120mg/m ²)【再発難治単独・DLBCL BR】	21	トレアキシ点点滴静注液(100mg/V)	120	mg/m ²	1~2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	POLA-BENDA	21	トレアキシ点点滴静注液(100mg/V)	90	mg/m ²	1
				ポライビー点滴静注用(30, 140mg/V)	1. 8	mg/kg	1
				トレアキシ点点滴静注液(100mg/V)	90	mg/m ²	2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ボテリジオ	7	ボテリジオ点滴静注(20mg/V)	1	mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	Hyper-CVAD(Hyper-CVAD/MA交替療法)	21	注射用エンドキサン(500mg/V)	300	mg/m ²	1~3
				ドキシソルビシン(10, 50mg/V)	25	mg/m ²	4
				オンコビン注射用(1mg/V)	1. 4	mg/m ²	4, 11
				ドキシソルビシン(10, 50mg/V)	25	mg/m ²	5
				メソトレキセート点滴静注液(5, 50, 200, 1000mg/V)	800	mg/m ²	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MA(Hyper-CVAD/MA交替療法)	21	メソトレキセート点滴静注液(5, 50, 200, 1000mg/V)	200	mg/m ²	1
				キロサイド(シタラビン)(20, 200, 400, 1000mg/本)	2000	mg/m ²	2~3
				ロイコボリン注3mg	15	mg/m ²	2~3
				ロイコボリン注3mg	15	mg/m ²	3
				ロイコボリン注3mg	15	mg/m ²	3~4
				ウロミテキサン注(400mg/V)	24	mg/kg	1~2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	LEED		ラステット注(100mg/V)	165	mg/m ²	1~2
				ラステット注(100mg/V)	170	mg/m ²	1~2
				注射用エンドキサン(500mg/V)	60	mg/kg	1~2
				ラステット注(100mg/V)	165	mg/m ²	3
				ラステット注(100mg/V)	170	mg/m ²	3
				アルケラン静注用(50mg/V)	65	mg/m ²	4
			21	メソトレキセート点滴静注液(5, 50, 200, 1000mg/V)	500	mg/m ²	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5, 50, 200, 1000mg/	3000	mg/m ²	1
				キロサイド(シタラビン)(20, 200, 400, 1000mg/本)	2000	mg/m ²	2~3
				ロイコボリン注3mg	24	mg	2~3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MTX(3. 5g/m ²)	14	ロイコボリン注3mg	24	mg	3~4
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5, 50, 200, 1000mg/	3500	mg/m ²	1
				ロイコボリン注3mg	24	mg	2~3
				ロイコボリン注3mg	24	mg	2~4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エンドキサン単独		ロイコボリン注3mg	24	mg	3~4
				注射用エンドキサン(500mg/V)	500	mg	1

血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHOEP	21	オンコビン注射用(1mg/V) ドキソルビシン(10, 50mg/V) ラステット注(100mg/V) 注射用エンドキサン(500mg/V) ラステット注(100mg/V)	1. 4 50 100 750 100	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1 1 1 1 2~3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ブララトレキサート	49	ジフォルタ注射液(20mg/V)	30	mg/m ²	1, 8, 15, 22, 29, 36
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ロミデプシン	28	イストダックス点滴静注用(10mg/V)	14	mg/m ²	1, 8, 15
血液内科	非ホジキンリンパ腫	アドセトリス【再発PTCL】	21	アドセトリス点滴静注(50mg/V)	1. 8	mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MR-(CHOP)	21	メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ リツキサン注(100, 500mg/V) ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg	2000 375 21 21 21	mg/m ² mg/m ² mg mg mg	1 1 2~3 2~4 3~4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MPV(奇数コース)	14	オンコビン注射用(1mg/V) メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ プロカルバジン ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg	1. 4 3500 100 24 24	mg/m ² mg/m ² mg/m ² (体表面積別) mg mg	1 1 1~7 2~3 3~4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MPV(偶数コース)	14	オンコビン注射用(1mg/V) メソトレキセート点滴静注液(500ml) (5, 50, 200, 1000mg/ ロイコボリン注3mg ロイコボリン注3mg	1. 4 3500 24 24	mg/m ² mg/m ² mg mg	1 1 2~3 3~4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	HD-AraC(3g)	28	キロサイド(シタラビン)(20, 200, 400, 1000mg/本)	3000	mg/m ²	1~2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BU-TT		ブスルフェクス点滴静注用(60mg/V) リサイオ点滴静注液(100mg/V)	3. 2 5	mg/kg mg/kg	1~4 5~6
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エブキンリ皮下注(1サイクル目 or 再開用)	28	エブキンリ皮下注(4mg/V) エブキンリ皮下注(48mg/V) エブキンリ皮下注(48mg/V) エブキンリ皮下注(4mg/V)	0. 16 48 48 0. 8	mg mg mg mg	1 15 22 8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エブキンリ皮下注(2~3サイクル目)	28	エブキンリ皮下注(48mg/V)	48	mg	1, 8, 15, 22
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エブキンリ皮下注(4サイクル目以降)	14	エブキンリ皮下注(48mg/V)	48	mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ルンスミオ(1サイクル目)	21	ルンスミオ点滴静注(1, 30mg/V) ルンスミオ点滴静注(1, 30mg/V) ルンスミオ点滴静注(1, 30mg/V)	1 60 2	mg mg mg	1 15 8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ルンスミオ(2サイクル目)	21	ルンスミオ点滴静注(1, 30mg/V)	60	mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ルンスミオ(3サイクル目以降)	21	ルンスミオ点滴静注(1, 30mg/V)	30	mg	1