レジメン一覧（レジメン名・1コースの期間・抗がん剤の用量・投与Day）

注：血液内科等のレジメンは組み合わせて使用するものもあります（R-CHOP = レジメン名：RITとCHOP等）。不明な場合は別途お問い合わせください。

※「Ctrl＋F」で検索が可能です。

更新日：2026年9月14日

診療科	がん種	レジメン名	ｺｰｽ期間	薬品	基準値	Day
消化器	胃がん	weekly−PTX80	28	パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
消化器	胃がん	tri−weekly DTX	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
消化器	胃がん	bi−weekly CPT	14	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
消化器	胃がん	TS−1&CDDP	35	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～21
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	8
消化器	胃がん	Short Hydration TS−1&CDDP	35	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～21
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	8
消化器	胃がん	TS−1&CDDP+Tmab【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	TS−1&CDDP+Tmab(2コース以降)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Short Hydration TS−1&CDDP+Tmab【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Short Hydration TS−1&CDDP+Tmab(2コース以降)	21	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab(2コース以降)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab Short Hydration【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	XP+trastuzumab Short Hydration(2コース以降)	21	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	RAM+PTX(1ｺｰｽ目)	28	サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
				サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	8
消化器	胃がん	RAM+PTX(2ｺｰｽ目以降)	28	サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	1、15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	8
消化器	胃がん	CapeOX(XELOX)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	SOX(I−OHP 130mg/㎡)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	SOX(I−OHP 100mg/㎡)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	100 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Abraxane−3W	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	260 mg/㎡	1
消化器	胃がん	ニボルマブ	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	胃がん	CapeOX(XELOX)+Tmab【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	CapeOX(XELOX)+Tmab(2コース以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	SOX+Tmab【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	SOX+Tmab(2コース以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	m−FOLFOX6+Tmab【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	5−FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5−FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
消化器	胃がん	m−FOLFOX6+Tmab(2コース以降)	21	5−FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5−FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
消化器	胃がん	Tmab 6mg/kg(FOLFOX併用)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1

消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(初回)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(初回)【ｱﾛｶﾘｽあり】	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(2ｺｰｽ以降)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	トラスツズマブデルクステカン(2ｺｰｽ以降)【ｱﾛｶﾘｽあり】	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	6.4 mg/kg	1
消化器	胃がん	Nivo+SOX	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Nivo+CapeOX	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1
				カペシタビン300mg「ﾔｸﾙﾄ」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Nivo+m-FOLFOX6	14	５－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	胃がん	Pembrolizumab+SOX	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Pembrolizumab+CapeOX	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				カペシタビン300mg「ﾔｸﾙﾄ」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+FP【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+FP(2ｺｰｽ以降)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+CapeOX(XELOX)【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ﾔｸﾙﾄ」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+CapeOX(XELOX)(2ｺｰｽ以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ﾔｸﾙﾄ」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+SOX【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	Pembrolizumab+Tmab+SOX(2ｺｰｽ以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+m-FOLFOX6(初回)【DM(-)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝあり】★入院限定	14	５－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	800 mg/㎡	1
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+m-FOLFOX6(2ｺｰｽ目以降)【DM(-)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝあり】【BSA1.2以上】	14	５－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	400 mg/㎡	1
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+CapeOX(初回)【DM(-)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝあり】★入院限定	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	800 mg/㎡	1
				カペシタビン300mg「ﾔｸﾙﾄ」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+CapeOX(2ｺｰｽ目以降)【DM(-)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝあり】【BSA1.2以上】	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	600 mg/㎡	1
				カペシタビン300mg「ﾔｸﾙﾄ」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+m-FOLFOX6(初回)【DM(+)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝなし】★入院限定	14	５－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	800 mg/㎡	1
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+m-FOLFOX6(2ｺｰｽ目以降)【DM(+)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝなし】【BSA1.2以上】	14	５－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	400 mg/㎡	1
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+CapeOX(初回)【DM(+)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝなし】★入院限定	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1

				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	800 mg/㎡	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+CapeOX(2ｺｰｽ目以降)【DM(+)→ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝなし】【BSA1.2以上】	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ビロイ点滴静注用(100,300mg/V)	600 mg/㎡	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	m-FOLFOX6(持続5-FU点滴ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) ★入院限定	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	胃がん	Nivo+m-FOLFOX6(持続5-FU点滴ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) ★入院限定	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	胃がん	D-FLOT（術前）★入院限定	28	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2600 mg/㎡	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	50 mg/㎡	1
				5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2600 mg/㎡	15
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	15
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	50 mg/㎡	15
消化器	胃がん	D-FLOT（術後）★入院限定	28	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2600 mg/㎡	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	50 mg/㎡	1
				5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2600 mg/㎡	15
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	15
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	50 mg/㎡	15
消化器	胃がん	D(D-FLOT)(術後3コース目以降)	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
消化器	胃がん	CAPOX+Tislelizumab(1コース目)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				テビムブラ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	CAPOX+Tislelizumab(2コース目以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				テビムブラ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	m-FOLFOX6	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	胃がん	TS1&DTX	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	40 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	TS1&DTX(術後補助化学療法2～7ｺｰｽ)	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	40 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	胃がん	RAM+nab-PTX(1ｺｰｽ目)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	1
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	15
				サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	15
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8
消化器	胃がん	RAM+nab-PTX(2ｺｰｽ目以降)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1、15
				サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	1、15
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8
消化器	炎症性腸疾患	消化器レミケード(導入)	99	レミケード点滴静注用(100mg/V)	5 mg/kg	1、15、43
消化器	炎症性腸疾患	消化器レミケード(維持)	56	レミケード点滴静注用(100mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	肝臓がん	アテゾリズマブ＋ベバシズマブ(1ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
消化器	肝臓がん	アテゾリズマブ＋ベバシズマブ(2ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
消化器	肝臓がん	アテゾリズマブ＋ベバシズマブ(3ｺｰｽ目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
消化器	肝臓がん	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ併用療法(1ｺｰｽ目)(体重30kg以上)	28	イジュド点滴静注(300mg/V)	300 mg	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
消化器	肝臓がん	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ併用療法(2ｺｰｽ目以降)(体重30kg以上)	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	Bv＋IRIS(1コース目)	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	100 mg/㎡	15
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	15
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	Bv＋IRIS(2コース以降)	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	100 mg/㎡	1、15
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1、15
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	CRT-IRIS【S1】	5	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～5 ※放射線にあわせて
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	CRT-IRIS【CPT】	7	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	CRT-S1	5	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～5 ※放射線にあわせて
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	Bv+SOX(1コース目)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1

				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	Bv+SOX(2コース目)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	Bv+SOX(3コース目以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	SOX	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-S1ﾍﾞｰｽ	CRT_S1+MMC	42	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14、29～42
				マイトマイシン注用(2,10mg/V)	10 mg/㎡	1、29
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv＋XELIRI(1コース目)	21	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	200 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	1800 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv＋XELIRI(2コース目)	21	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	200 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	1800 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv＋XELIRI(3コース以降)	21	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	200 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	1800 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	CapeOX(XELOX)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv+CapeOX(XELOX)(1コース目)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv+CapeOX(XELOX)(2コース目)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv+CapeOX(XELOX)(3コース目以降)	21	エルプラット注射用(50,100mg/V)	130 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv+Capecitabine(1コース目)	21	ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv+Capecitabine(2コース目)	21	ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-Xelodaﾍﾞｰｽ	Bv+Capecitabine(3コース目以降)	21	ベバシズマブBS(100,400mg/V)	7.5 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
消化器	結腸・直腸-その他	FOLFOXIRI (JACCRO CC-13試験 PⅡ)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(1コース目)【JACCRO CC-11試験 PⅡ】	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(2コース目)【JACCRO CC-11試験 PⅡ】	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Bv+FOLFOXIRI(3コース目以降)【JACCRO CC-11試験 PⅡ】	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸-その他	Cmab＋CPT-11(1コース目)	14	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8
消化器	結腸・直腸-その他	Cmab＋CPT-11(2コース目以降)	14	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1、8
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ】(1ｺｰｽ目)	7	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				ビラフトビカプセル75mg	300 mg	1～7
				メクトビ錠15mg	90 mg	1～7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ】(2ｺｰｽ目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1
				ビラフトビカプセル75mg	300 mg	1～7
				メクトビ錠15mg	90 mg	1～7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ】	14	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				ビラフトビカプセル75mg	300 mg	1～14
				メクトビ錠15mg	90 mg	1～14
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ】(1ｺｰｽ目)	7	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				ビラフトビカプセル75mg	300 mg	1～7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ】(2ｺｰｽ目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1
				ビラフトビカプセル75mg	300 mg	1～7
消化器	結腸・直腸-その他	BEACON【Cmab【隔週投与】+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ】	14	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1

				ビラフトビカプセル75mg	300 mg	1～14
消化器	結腸・直腸−その他	Bv+ロンサーフ	28	ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1、15
				ロンサーフ配合錠	70 mg/㎡(体表面積別)	1～5、8～12
消化器	結腸・直腸−その他	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
消化器	結腸・直腸−その他	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ【2ｺｰｽ目以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
消化器	結腸・直腸−その他	Pembrolizumab(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
消化器	結腸・直腸−その他	Ipi+Nivo	21	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
				ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸−その他	Nivo単剤（2週毎）	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	結腸・直腸−その他	Nivo単剤（4週毎）	28	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
消化器	結腸・直腸−その他	ｿﾄﾗｼﾌﾞ+ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	28	ベクティビックス点滴静注(100mg/V)	6 mg/kg	1
				ベクティビックス点滴静注(100mg/V)	6 mg/kg	15
消化器	結腸・直腸−分子標的薬単独	Pmab	14	ベクティビックス点滴静注(100mg/V)	6 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸−分子標的薬単独	Cmab(初回)	7	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸−分子標的薬単独	Cmab(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸−分子標的薬単独	Cmab【隔週投与】	14	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	FOLFIRI	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Bv＋FOLFIRI(1コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Bv＋FOLFIRI(2コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Bv＋FOLFIRI(3コース目以降)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Cmab＋FOLFIRI(1コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Cmab＋FOLFIRI(2コース以降)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1、8
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Cmab＋FOLFIRI【隔週投与】	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	RAM＋FOLFIRI(1ｺｰｽ目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	RAM＋FOLFIRI(2ｺｰｽ目以降)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	8 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Pmab＋FOLFIRI	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				ベクティビックス点滴静注(100mg/V)	6 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFIRIﾍﾞｰｽ	Aflibercept＋FOLFIRI	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				ザルトラップ点滴静注(100,200mg/V)	4 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	m−FOLFOX6	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Bv+m−FOLFOX6(1コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Bv+m−FOLFOX6(2コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1

				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Bv+m-FOLFOX6(3コース目以降)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Cmab＋m-FOLFOX6(1コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Cmab＋m-FOLFOX6(2コース目以降)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1、8
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Cmab＋m-FOLFOX6【隔週投与】	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸FOLFOXﾍﾞｰｽ	Pmab+m-FOLFOX6	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
				ベクティビックス点滴静注(100mg/V)	6 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2ﾍﾞｰｽ	sLV5FU2	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2ﾍﾞｰｽ	Bv+sLV5FU2(1コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2ﾍﾞｰｽ	Bv+sLV5FU2(2コース目)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	結腸・直腸sLV5FU2ﾍﾞｰｽ	Bv+sLV5FU2(3コース目以降)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				ベバシズマブBS(100,400mg/V)	5 mg/kg	1
消化器	原発不明癌	TC:原発不明	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	180 mg/㎡	1
消化器	原発不明癌	ニボルマブ	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	小腸癌	m-FOLFOX6	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	消化器(その他)	CDDP+ETP(short hydration)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
消化器	食道がん	tri-weekly DTX	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
消化器	食道がん	weekly-PTX	49	パクリタキセル注(30,100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15、22、29、36
消化器	食道がん	Nivo(2週毎)	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	食道がん	Nivo(2週毎)【術後補助療法】	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
消化器	食道がん	Nivo(4週毎)	28	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
消化器	食道がん	Nivo(4週毎)【術後補助療法】	28	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
消化器	食道がん	Ipi+Nivo(2週毎)	42	ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1、15、29
消化器	食道がん	Ipi+Nivo(3週毎)	42	ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
				オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1、22
消化器	食道がん	FP+Nivo(2週毎)	28	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	15
消化器	食道がん	FP+Nivo(4週毎)	28	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	FP+Nivo(2週毎) Short Hydration【5-FU：ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限定】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5－FU(250ml)【120時間用】(250,1000mg/V)	4000 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	15
消化器	食道がん	FP+Nivo(4週毎) Short Hydration【5-FU：ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限定】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5－FU(250ml)【120時間用】(250,1000mg/V)	4000 mg/㎡	1
				オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
消化器	食道がん	NAC_DCF	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	70 mg/㎡	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	750 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	FP+RT療法	56	5－FU注(250,1000mg/V)	750 mg/㎡	1～4、29～32

				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	70 mg/㎡	1、29
消化器	食道がん	standard-FP	28	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	NAC-FP	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ(維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	FP+RT療法 Short Hydration【5-FU:ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限定】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	56	5－FU注(250ml)【96時間用】(250,1000mg/V)	3000 mg/㎡	1、29
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	70 mg/㎡	1、29
消化器	食道がん	standard-FP Short Hydration【5-FU:ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限定】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	28	5－FU(250ml)【120時間用】(250,1000mg/V)	4000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
消化器	食道がん	NAC-FP Short Hydration【5-FU:ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限定】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	21	5－FU(250ml)【120時間用】(250,1000mg/V)	4000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ Short Hydration【5-FU:ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限定】(短時間水分負荷可能患者のみ可)	21	5－FU(250ml)【120時間用】(250,1000mg/V)	4000 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
消化器	食道がん	FP+キイトルーダ(維持療法)【5-FU:ｼｭｱﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ ★CVﾎﾟｰﾄ限	21	5－FU(250ml)【120時間用】(250,1000mg/V)	4000 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
消化器	食道がん	FOLFOX(RT併用)	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	1600 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	食道がん	FOLFOX(RT併用)(持続5-FU点滴ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) ★入院限定	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	1600 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	食道がん	FP+Tislelizumab(1コース目)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				テビムブラ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	食道がん	FP+Tislelizumab(2コース目以降)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				テビムブラ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1～5
消化器	肛門管がん	Retifanlimab+CBDCA+PTX(1～6コース目)	28	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
				ｼﾞﾆｲｽﾞ点滴静注(500mg/V)	500 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	8、15
消化器	肛門管がん	Retifanlimab(7コース目以降)	28	ｼﾞﾆｲｽﾞ点滴静注(500mg/V)	500 mg	1
消化器	膵臓・胆道癌	GEMUCITABIN(3投1休)	28	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8、15
消化器	膵臓・胆道癌	GC療法	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1、8
消化器	膵臓・胆道癌	FOLFIRINOX	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	180 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	膵臓・胆道癌	modified FOLFIRINOX	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	150 mg/㎡	1
				エルプラット注射用(50,100mg/V)	85 mg/㎡	1
消化器	膵臓・胆道癌	S-1&GEM(胆道がん)	21	エスワンタイホウ配合OD錠	60 mg/㎡(体表面積別)	1～14
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
消化器	膵臓・胆道癌	S-1&GEM(膵臓がん術前化学療法)	21	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
消化器	膵臓・胆道癌	GEMUCITABIN(2投1休)	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
消化器	膵臓・胆道癌	GC療法 Short Hydration	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1、8
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab療法(30kg以上) Short Hydration(ﾏﾝﾆﾄｰﾙver.)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	8
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab療法(30kg以上) Short Hydration(ﾌﾛｾﾐﾄﾞver.)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	8
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Durvalumab(30kg以上)維持療法	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Pembrolizumab療法 Short Hydration(ﾏﾝﾆﾄｰﾙver.)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1

				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	8
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Pembrolizumab療法 Short Hydration(ﾌﾛｾﾐﾄﾞver.)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	8
消化器	膵臓・胆道癌	GC+Pembrolizumab療法(CDDPなし)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
消化器	膵臓・胆道癌	GCS療法	14	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～7
消化器	膵臓・胆道癌	GCS療法 Short Hydration	14	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～7
消化器	膵臓・胆道癌	オニバイド＋5-FU＋l-LV	14	5－FU注(100mL用)(250,1000mg/V)	2400 mg/㎡	1
				オニバイド点滴静注(43mg/V)	70 mg/㎡	1
消化器	膵臓・胆道癌	ABI/GEM	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	125 mg/㎡	1、8、15
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8、15
消化器	膵臓・胆道癌	ストレプトゾシン	7	ザノサー点滴静注用(1g/V)	1000 mg/㎡	1
眼科	その他(眼科)	眼科レミケード(導入)	99	レミケード点滴静注用(100mg/V)	5 mg/kg	1、15、43
眼科	その他(眼科)	眼科レミケード(維持)	56	レミケード点滴静注用(100mg/V)	5 mg/kg	1
呼吸器	悪性胸膜中皮腫	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(3週毎)+ﾔｰﾎﾞｲ	42	ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
				オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1、22
呼吸器	悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
呼吸器	小細胞癌	CDDP+CPT-11	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	8、15
呼吸器	小細胞癌	CDDP+CPT-11(short hydration)	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	8、15
呼吸器	小細胞癌	CPT-11単剤	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
呼吸器	小細胞癌	CBDCA+ETP	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ラステット注(100mg/V)	80 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	80 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋CBDCA+ETP(1ｺｰｽ目)	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋CBDCA+ETP(2ｺｰｽ目以降)	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋CBDCA+ETP【維持療法】	21	テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CDDP+ETP(体重30kg以上)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CDDP+ETP【維持療法】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CBDCA+ETP(体重30kg以上)	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CBDCA+ETP【維持療法】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	小細胞癌	イムデトラ(1コース目)【Day15はﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝなし】	28	イムデトラ点滴静注用(1mg/V)	1 mg	1
				イムデトラ点滴静注用(10mg/V)	10 mg	15
				イムデトラ点滴静注用(10mg/V)	10 mg	8
呼吸器	小細胞癌	イムデトラ(2コース目以降)【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝなし】	28	イムデトラ点滴静注用(10mg/V)	10 mg	1、15
呼吸器	小細胞癌	【放射線併用】CDDP+ETP(RT終了後、21日毎に変更可)(short hydration)	28	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	【術後】CDDP+ETP(short hydration)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
呼吸器	小細胞癌	【CRT後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+ETP【4週毎】【維持療法】	28	テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
呼吸器	小細胞癌	nab-PTX(weekly)	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
呼吸器	小細胞癌	AMR単剤	28	カルセド注射用(20,50mg/V)	40 mg/㎡	1～3

呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(2週毎)	14 オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(4週毎)	28 オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	nab-PTX(weekly)	21 アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
呼吸器	非小細胞癌	AMR単剤	28 カルセド注射用(20,50mg/V)	40 mg/㎡	1～3
呼吸器	非小細胞癌	PEM単剤	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	CDDP+PEM	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	GEM1・8・15	28 ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	800 mg/㎡	1、8、15
呼吸器	非小細胞癌	【術後】CDDP+VNR	21 シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
			ロゼウス静注液(40mg/V)	25 mg/㎡	1
			ロゼウス静注液(40mg/V)	25 mg/㎡	8
呼吸器	非小細胞癌	VNR単剤	21 ロゼウス静注液(40mg/V)	25 mg/㎡	1、8
呼吸器	非小細胞癌	DTX単剤	21 ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	60 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	DTX+RAM(1ｺｰｽ目)	21 サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
			ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	60 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	DTX+RAM(2ｺｰｽ目以降)	21 サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
			ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	60 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【放射線併用】CDDP+DTX(Short Hydration)	28 シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	40 mg/㎡	1、8
			ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	40 mg/㎡	1、8
呼吸器	非小細胞癌	【CRT後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	28 イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CDDP+PEM(short hydration)	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			イジュド点滴静注(25mg/V)	75 mg	1
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
			シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CBDCA+PEM	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			イジュド点滴静注(25mg/V)	75 mg	1
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CDDP or CBDCA+PEM【維持療法 1～2回目】	56 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
			アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	29
			イジュド点滴静注(25mg/V)	75 mg	29
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	29
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CDDP or CBDCA+PEM【維持療法 3回目以降】	28 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CBDCA+nab-PTX	21 アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
			イジュド点滴静注(25mg/V)	75 mg	1
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CBDCA+nab-PTX【維持療法 1～2回目】	56 イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
			イジュド点滴静注(25mg/V)	75 mg	29
			イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	29
呼吸器	非小細胞癌	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｲｼﾞｭﾄﾞ+CBDCA+nab-PTX【維持療法 3回目以降】	28 イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ単剤	21 キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(2週毎)+ﾔｰﾎﾞｲ	42 ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
			オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1、15、29
呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(3週毎)+ﾔｰﾎﾞｲ	42 ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
			オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1、22
呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ+CBDCA+PEM	42 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
			アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	22
			オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	22
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	22
呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ+CBDCA+PEM【維持療法】	42 ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
			オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1、22
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+PEM	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+PEM【維持療法】	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ+CBDCA+PTX	42 オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
			ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
			オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	22
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	22
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	22

呼吸器	非小細胞癌	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ+CBDCA+PTX【維持療法】	42 ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
			オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1、22
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+PTX	21 カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+PTX【維持療法】	21 キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PTX	21 カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【術後】CBDCA+PTX	21 カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+nab-PTX	21 アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
			アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
呼吸器	非小細胞癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CBDCA+nab-PTX【維持療法】	21 キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ単剤【3週毎】(1ｺｰｽ目)	21 テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ単剤【3週毎】(2ｺｰｽ目以降)	21 テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	【術後】ﾃｾﾝﾄﾘｸ【3週毎】(1ｺｰｽ目)	21 テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	【術後】ﾃｾﾝﾄﾘｸ【3週毎】(2ｺｰｽ目以降)	21 テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+nab-PTX(1ｺｰｽ目)	21 アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
			アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+nab-PTX(2ｺｰｽ目以降)	21 アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
			アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+nab-PTX【維持療法】	21 テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+nab-PTX	21 アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
			アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+BEV+CBDCA+PTX(1ｺｰｽ目)	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+BEV+CBDCA+PTX(2ｺｰｽ目)	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+BEV+CBDCA+PTX(3ｺｰｽ以降)	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+BEV+CBDCA+PTX【維持療法】	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			テセントリク点滴静注(1200mg/V)	1200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	【放射線併用】CBDCA+PTX	42 カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	2 AUC	1、8、15、22、29、36
			パクリタキセル注(30,100mg/V)	40 mg/㎡	1、8、15、22、29、36
呼吸器	非小細胞癌	【放射線併用】高齢者CBDCA	28 カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	30 mg/㎡	1～5、8～12、15～19、22～26
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA＋S-1	21 カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
			エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV(1コース目)	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV(2コース目)	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV(3コース目以降)	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	CBDCA+PEM+BEV【維持療法】	21 アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
			アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	RAM+EGFR-TKI(1ｺｰｽ目)	14 サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
呼吸器	非小細胞癌	RAM+EGFR-TKI(2ｺｰｽ目以降)	14 サイラムザ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+GEM【術前】	21 キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
			ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
			シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
			ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+GEM【術後】	21 キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+PEM【術前】	21 アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
			キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
			シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+CDDP+PEM【術後】	21 キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1

呼吸器	非小細胞癌	ﾀｸﾞﾘｯｿ+CDDP+PEM(short hydration)	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾀｸﾞﾘｯｿ+CBDCA+PEM	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾀｸﾞﾘｯｿ+PEM【維持療法】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前】ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+CBDCA+PTX	21	オプジーボ点滴静注(3、6週用)(120,240mg/V)	360 mg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CBDCA+PTX【術前】	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CDDP+GEM【術前】	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CBDCA+GEM【術前】	21	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CDDP+PEM【術前】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CBDCA+PEM【術前】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
呼吸器	非小細胞癌	【術前術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ【術後】	28	イミフィンジ点滴静注(500mg/V)	1500 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	エンハーツ(初回)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	5.4 mg/kg	1
呼吸器	非小細胞癌	エンハーツ(2コース目以降)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	5.4 mg/kg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ単剤【4週毎】(1コース目)	28	テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ単剤【4週毎】(2コース目以降)	28	テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	【術後】ﾃｾﾝﾄﾘｸ【4週毎】(1コース目)	28	テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	【術後】ﾃｾﾝﾄﾘｸ【4週毎】(2コース目以降)	28	テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+nab-PTX【4週毎】【維持療法】	28	テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+CBDCA+PEM(1コース目)【80kg未満】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	1600 mg	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2400 mg	15
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2400 mg	8
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+CBDCA+PEM(2～4コース目)【80kg未満】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2400 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+CBDCA+PEM(維持療法)【80kg未満】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2400 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+CBDCA+PEM(1コース目)【80kg以上】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2240 mg	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	3360 mg	15
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	3360 mg	8
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+CBDCA+PEM(2～4コース目)【80kg以上】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	3360 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+CBDCA+PEM(維持療法)【80kg以上】	21	アリムタ注射用(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	3360 mg	1
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ(1コース目)【80kg未満】	28	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	1600 mg	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	1600 mg	8、15、22
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ(2コース目以降)【80kg未満】	28	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	1600 mg	1、15
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ(1コース目)【80kg以上】	28	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2240 mg	1
				ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2240 mg	8、15、22
呼吸器	非小細胞癌	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ+ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ(2コース目以降)【80kg以上】	28	ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ配合皮下注(1600mg/V)	2240 mg	1、15
産婦人科	その他(婦人科)	AI療法	21	ウロミテキサン注(400mg/V)	400 mg	1
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	20 mg/㎡	1
				注射用イホマイド(1g/V)	2000 mg/㎡	1
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400 mg	2～3
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	20 mg/㎡	2～3
				注射用イホマイド(1g/V)	2000 mg/㎡	2～3
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400 mg	4～5
				注射用イホマイド(1g/V)	2000 mg/㎡	4～5
産婦人科	その他(婦人科)	ヨンデリス	21	ヨンデリス点滴静注用(1mg/V)	1.2 mg/㎡	1
産婦人科	その他(婦人科)	Eribulin	21	ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、8
産婦人科	その他(婦人科)	ドキソルビシン単剤	21	ドキソルビシン(10,50mg/V)	20 mg/㎡	1～3
産婦人科	その他(婦人科)	MTX療法	1	注射用メソトレキセート(50mg/V)	50 mg/㎡	1
産婦人科	子宮体癌	TC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1

				パクリタキセル注(30,100mg/V)	180 mg/㎡	1
産婦人科	子宮体癌	AP	21	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
産婦人科	子宮体癌	ペムブロリズマブ	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮体癌	PEM+LEN(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮体癌	PEM【6週毎】+LEN(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
産婦人科	子宮体癌	DP	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	子宮体癌	PEM+TC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮体癌	PEM+TC(PEM維持療法)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
産婦人科	子宮体癌	CPA	21	注射用エンドキサン(500mg/V)	15 mg/kg	1
産婦人科	子宮頸癌	TC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	180 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+RT(CCRT)	7	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	40 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM(3週毎、CDDP+RTと併用→終了後は単剤)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM(6週毎、CDDP+RTと併用→終了後は単剤)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(1ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(2ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	CDDP+PTX+Bev(3ｺｰｽ目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	TPO+PTX+Bev(1ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	0.75 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
				ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	0.75 mg/㎡	2～3
産婦人科	子宮頸癌	TPO+PTX+Bev(2ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	0.75 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
				ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	0.75 mg/㎡	2～3
産婦人科	子宮頸癌	TPO+PTX+Bev(3ｺｰｽ目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	0.75 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
				ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	0.75 mg/㎡	2～3
産婦人科	子宮頸癌	PE(CDDP+ETP)【小細胞がん】	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～3
産婦人科	子宮頸癌	CPT-11単剤	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(1ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(2ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(3ｺｰｽ目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC+Bev(PEM+Bev維持療法)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TC(PEM維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(1ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(2ｺｰｽ目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(3ｺｰｽ目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1

産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP+Bev(PEM+Bev維持療法)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	子宮頸癌	PEM+TP(PEM維持療法)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
産婦人科	子宮頸癌	テブダック	21	ﾃﾌﾞﾀﾞｯｸ点滴静注用(40mg/V)	2 mg/kg	1
産婦人科	卵巣癌	WeeklyTC	28	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	1.5 AUC	1、8、15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
産婦人科	卵巣癌	ddTC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
産婦人科	卵巣癌	TC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	180 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	DC	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	weekly GEM	28	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8、15
産婦人科	卵巣癌	DTX	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	CPT-11	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
産婦人科	卵巣癌	wIP	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	60 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	8、15
産婦人科	卵巣癌	脱感作:wIP	28	イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	1
				シスプラチン注(脱感作 生食200)(10,50mg/V)	54 mg/㎡	1
				シスプラチン注(脱感作用)(10,50mg/V)	5.4 mg/㎡	1
				シスプラチン注(脱感作用)(10,50mg/V)	0.54 mg/㎡	1
				シスプラチン注(脱感作用)(10,50mg/V)	0.054 mg/㎡	1
				イリノテカン点滴静注(40,100mg/V)	60 mg/㎡	8、15
産婦人科	卵巣癌	Doxil	28	ドキシル注(20mg/V)	40 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev(Bev1回目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev(Bev2回目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	TC+Bev(Bev3回目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	Bev maintenance	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
産婦人科	卵巣癌	Weekly PTX+Bev(Bev初回)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15、22
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	Weekly PTX+Bev(Bev3回目以降)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1、15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15、22
産婦人科	卵巣癌	脱感作：TC+Bev	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.45 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.045 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.005 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	175 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	脱感作：DC+Bev	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.005 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.045 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.45 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	4.5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev(Bev1回目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev(Bev2回目)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	DC+Bev(Bev3回目以降)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	70 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	PLD+CBDCA	28	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドキシル注(20mg/V)	30 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	脱感作:PLD+CBDCA	28	カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.45 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.005 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.045 AUC	1
				ドキシル注(20mg/V)	30 mg/㎡	1
産婦人科	卵巣癌	PLD-C+Bev(1ｺｰｽ目)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1

				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドキシル注(20mg/V)	30 mg/㎡	1
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	PLD-C+Bev(2ｺｰｽ目以降)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドキシル注(20mg/V)	30 mg/㎡	1
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	脱感作:PLD-C+Bev(1ｺｰｽ目)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.45 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.005 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.045 AUC	1
				ドキシル注(20mg/V)	30 mg/㎡	1
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	脱感作:PLD-C+Bev(2ｺｰｽ目以降)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	4.5 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.45 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.045 AUC	1
				カルボプラチン注射液(250ml)(50,150,450mg/V)	0.005 AUC	1
				ドキシル注(20mg/V)	30 mg/㎡	1
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	TPO	21	ハイカムチン注射用(1.1mg/V)	1.5 mg/㎡	1～5
産婦人科	卵巣癌	PLD+Bev 1ｺｰｽ目	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				ドキシル注(20mg/V)	40 mg/㎡	1
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	PLD+Bev 2ｺｰｽ目以降	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				ドキシル注(20mg/V)	40 mg/㎡	1
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
産婦人科	卵巣癌	BEP療法(悪性卵巣胚細胞腫瘍)	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	20 mg/㎡	1
				ブレオ注射用(5mg/V)	30 mg	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	20 mg/㎡	2～5
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～5
				ブレオ注射用(5mg/V)	30 mg	8、15
産婦人科	絨毛性疾患	MTX 5-Day	5	注射用メソトレキセート(50mg/V)	0.4 mg/kg	1～5
産婦人科	絨毛性疾患	MTX-FA	8	注射用メソトレキセート(50mg/V)	1 mg/kg	1、3、5、7
産婦人科	絨毛性疾患	Act-D単剤	14	コスメゲン静注用(0.5mg/V)	0.01 mg/kg	1～5
産婦人科	絨毛性疾患	MEA療法	21	コスメゲン静注用(0.5mg/V)	0.5 mg	1
				メソトレキセート点滴静注液(MEA用)(50mg/V)	300 mg	1
				メソトレキセート点滴静注液(MEA用)(50mg/V)	150 mg	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg	1
				コスメゲン静注用(0.5mg/V)	0.5 mg	2～5
				ラステット注(100mg/V)	100 mg	2～5
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ドセタキセル	28	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	25 mg/㎡	1、8、15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	S-1&Docetaxel併用療法	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	40 mg/㎡	1
				エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/㎡(体表面積別)	1～14
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	頭頸部 CF	28	5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	2～5
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	2～6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab＋CF(1コース目)	21	5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	2～4
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	2～5
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8、15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab＋CF(2コース目以降)	21	5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	2～4
				5－FU注(250,1000mg/V)	400 mg/㎡	2～5
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8、15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab維持	7	アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CDDP+RT	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ドセタキセル+RT	42	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	10 mg/㎡	1、8、15、22、29、36
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+RT	56	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8、15、22、29、36、43、50
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+RT	7	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	1.5 AUC	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF	21	5－FU注(250,1000mg/V)	187.5 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
				ドセタキセル(20,80mg/V)	60 mg/㎡	1
				5－FU注(250,1000mg/V)	187.5 mg/㎡	2～5

				５－FU注(250,1000mg/V)	187.5 mg/㎡	2～6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF(CBDCA)	21	５－FU注(250,1000mg/V)	187.5 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ドセタキセル(20,80mg/V)	60 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	187.5 mg/㎡	2～5
				５－FU注(250,1000mg/V)	187.5 mg/㎡	2～6
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	ニボルマブ	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PCE(1ｺｰｽ)	21	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	2.5 AUC	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	100 mg/㎡	1
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	15
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	8
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	2.5 AUC	8
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	100 mg/㎡	8
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PCE(2ｺｰｽ以降)	21	アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1、8
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	2.5 AUC	1、8
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	100 mg/㎡	1、8
				アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	15
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+5-FU	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	1000 mg/㎡	1～4
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PTX+Cmab(1コース目)	7	アービタックス注射液(500ml)(100,500mg/V)	400 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	PTX+Cmab(2コース目以降)	7	アービタックス注射液(250ml)(100,500mg/V)	250 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Weekly PTX	49	パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15、22、29、36
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	FP+キイトルーダ	21	５－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	80 mg/㎡	1
				５－FU注(250,1000mg/V)	800 mg/㎡	2～4
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	FP＋キイトルーダ【キイトルーダ維持療法】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	WeeklyCDDP+RT	7	シスプラチン注(250ml)(10,50mg/V)	40 mg/㎡	1
整形外科	関節リウマチ	整形レミケード(導入)	98	レミケード点滴静注用(100mg/V)	3 mg/kg	1、15、43
整形外科	関節リウマチ	整形レミケード6週以降	56	レミケード点滴静注用(100mg/V)	3 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	Abraxane	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	260 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	Eribulin	21	ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、8
乳腺外科	乳がん	Eribulin【2週毎】	28	ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、15
乳腺外科	乳がん	Vinorelbine	21	ロゼウス静注液(40mg/V)	25 mg/㎡	1、8
乳腺外科	乳がん	weekly PTX	7	パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	tri-weeklyDTX75	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	600 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	600 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	MMK-TC+トラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	600 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ＋DTX【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	ﾌｪｽｺﾞIN＋DTX【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ＋DTX(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
乳腺外科	乳がん	ﾌｪｽｺﾞMA＋DTX【2コース以降】	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
乳腺外科	乳がん	Bmab+PTX(1コース目)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	90 mg/㎡	1、8、15
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
乳腺外科	乳がん	Bmab+PTX(2コース目以降)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1、15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	90 mg/㎡	1、8、15
乳腺外科	乳がん	Bmab+nabPTX(1コース目)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
乳腺外科	乳がん	Bmab+nabPTX(2コース目以降)	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1、15
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1、8、15
乳腺外科	乳がん	EC	21	エピルビシン注射用(10,50mg/V)	90 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	600 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	dd EC	14	エピルビシン注射用(10,50mg/V)	90 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	600 mg/㎡	1

乳腺外科	乳がん	TEC+Abraxane(1コース目)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				テセントリク点滴静注(840mg/V)	840 mg	1
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	15
				テセントリク点滴静注(840mg/V)	840 mg	15
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8
乳腺外科	乳がん	TEC+Abraxane(2コース目以降)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				テセントリク点滴静注(840mg/V)	840 mg	1
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	15
				テセントリク点滴静注(840mg/V)	840 mg	15
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8
乳腺外科	乳がん	Adjuvantトラスツズマブ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	Adjuvantトラスツズマブ(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	フェスゴIN【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
乳腺外科	乳がん	パージェタ+トラスツズマブ【2ｺｰｽ以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
乳腺外科	乳がん	フェスゴMA【2ｺｰｽ以降】	21	フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)HP【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)+ﾌｪｽｺﾞIN【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)HP(2ｺｰｽ以降)	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
乳腺外科	乳がん	TC(CBDCA)+ﾌｪｽｺﾞMA【2ｺｰｽ以降】	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	6 AUC	1
				ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
				フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
乳腺外科	乳がん	w-PTX＋パージェタ+トラスツズマブ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
乳腺外科	乳がん	w-PTX＋ﾌｪｽｺﾞIN【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
乳腺外科	乳がん	w-PTX＋パージェタ+トラスツズマブ【2ｺｰｽ以降】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
乳腺外科	乳がん	w-PTX＋ﾌｪｽｺﾞMA【2ｺｰｽ以降】	21	フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1、8、15
乳腺外科	乳がん	アブラキサン＋パージェタ+トラスツズマブ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	260 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン＋ﾌｪｽｺﾞIN	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	260 mg/㎡	1
				フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン＋パージェタ+トラスツズマブ【2ｺｰｽ以降】	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	260 mg/㎡	1
				トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
乳腺外科	乳がん	アブラキサン＋ﾌｪｽｺﾞMA	21	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	260 mg/㎡	1
				フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン＋パージェタ+トラスツズマブ【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	840 mg	1
				ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン＋ﾌｪｽｺﾞIN【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰｽﾞ)】	21	フェスゴ配合皮下注IN	1 V	1
				ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン＋パージェタ+トラスツズマブ(2ｺｰｽ以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				パージェタ点滴静注(420mg/V)	420 mg	1
				ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、8
乳腺外科	乳がん	ハラヴェン＋ﾌｪｽｺﾞMA【2ｺｰｽ以降】	21	フェスゴ配合皮下注MA	1 V	1
				ハラヴェン静注(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1、8
乳腺外科	乳がん	トラスツズマブ(ツカチニブ,カペシタビン併用)【初回(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｰ	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	8 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
乳腺外科	乳がん	トラスツズマブ(ツカチニブ,カペシタビン併用)(2コース以降)	21	トラスツズマブBS点滴静注用(60,150mg/V)	6 mg/kg	1
				カペシタビン300mg「ヤクルト」	2000 mg/㎡(体表面積別)	1～14
乳腺外科	乳がん	カドサイラ(初回)	21	カドサイラ(100,160mg/V)	3.6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	カドサイラ(2コース以降)	21	カドサイラ(100,160mg/V)	3.6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	エンハーツ(初回)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	5.4 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	エンハーツ(2コース以降)	21	エンハーツ点滴静注用(100mg/V)	5.4 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	ﾍﾟﾑﾌﾟﾛﾘｽﾞﾏﾌﾟ+GEM+CBDCA	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	2 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1

				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	2 AUC	8
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
乳腺外科	乳がん	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+PTX【2剤併用】	7	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	90 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+PTX【PTX単剤】	7	パクリタキセル注(30,100mg/V)	90 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+nabPTX【2剤併用】	7	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+nabPTX【nabPTX単剤】	7	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ単剤【PTX or nabPTX併用】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	EC+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	21	エピルビシン注射用(10,50mg/V)	90 mg/㎡	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	600 mg/㎡	1
乳腺外科	乳がん	PTX+CBDCA+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ【CBDCA3週毎】	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	8、15
乳腺外科	乳がん	PTX+CBDCA+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ【CBDCA1週毎】	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	1.5 AUC	1
				キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	1.5 AUC	8、15
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	80 mg/㎡	8、15
乳腺外科	乳がん	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(術後化学療法)【3週毎】	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
乳腺外科	乳がん	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(術後化学療法)【6週毎】	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
乳腺外科	乳がん	トロデルビ(1ｺｰｽ目)	21	ﾄﾛﾃﾞﾙﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	10 mg/kg	1
				ﾄﾛﾃﾞﾙﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	10 mg/kg	8
乳腺外科	乳がん	トロデルビ(2ｺｰｽ目以降)	21	ﾄﾛﾃﾞﾙﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	10 mg/kg	1
				ﾄﾛﾃﾞﾙﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	10 mg/kg	8
乳腺外科	乳がん	ダトロウェイ(1ｺｰｽ目)	21	ﾀﾞﾄﾛｳｪｲ点滴静注用(100mg/V)	6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	ダトロウェイ(2ｺｰｽ目以降)	21	ﾀﾞﾄﾛｳｪｲ点滴静注用(100mg/V)	6 mg/kg	1
乳腺外科	乳がん	TEC[4週毎]+Abraxane(1ｺｰｽ目)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
乳腺外科	乳がん	TEC[4週毎]+Abraxane(2ｺｰｽ目以降)	28	アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				テセントリク点滴静注(840mg/V)	1680 mg	1
				アブラキサン点滴静注用(100mg/V)	100 mg/㎡	8、15
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ(放射線併用期)	70	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
				テモダールカプセル	75 mg/㎡(体表面積別)	1～42
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	15
				アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	29、42
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ(維持療法期):1コース目	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1、15
				テモダールカプセル	150 mg/㎡(体表面積別)	1～5
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+TMZ(維持療法期):2コース目以降	28	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1、15
				テモダールカプセル	150 mg/㎡(体表面積別)	1～5
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン(3週毎)	21	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	15 mg/kg	1
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン(2週毎)	14	アバスチン点滴静注用(100,400mg/V)	10 mg/kg	1
脳神経外科	中枢神経悪性リンパ腫	R-MPV	14	リツキサン注(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.4 mg/㎡	2
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3500 mg/㎡	2
				プロカルバジン	100 mg/㎡(体表面積別)	2～8
				ロイコボリン注3mg	30 mg	3
				ロイコボリン注3mg	30 mg	4
				ロイコボリン注3mg	15 mg	5
				ロイコボリン注3mg	30 mg	5
				ロイコボリン注3mg	15 mg	6
脳神経外科	中枢神経悪性リンパ腫	HD-AraC	28	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	3000 mg/㎡	1～2
泌尿器科	移行上皮癌	GC	28	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	70 mg/㎡	2
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8、15
泌尿器科	移行上皮癌	Gcarbo	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	4.5 AUC	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8
泌尿器科	移行上皮癌	GN療法	28	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8、15
				アクプラ静注用(10,50,100mg/V)	70 mg/㎡	2
泌尿器科	移行上皮癌	GP	21	ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1
				パクリタキセル注(30,100mg/V)	200 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	8、15
泌尿器科	移行上皮癌	ペムブロリズマブ(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	ペムブロリズマブ(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	Avelumab	14	バベンチオ点滴静注(200mg/V)	10 mg/kg	1
泌尿器科	移行上皮癌	ｴﾝﾎﾙﾂﾏﾌﾞ･ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ療法	28	パドセブ点滴静注(20,30mg/V)	1.25 mg/kg	1、8、15
泌尿器科	移行上皮癌	Adjuvant Nivo(2週毎)	14	オプジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1

泌尿器科	移行上皮癌	Adjuvant Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
泌尿器科	移行上皮癌	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊﾞﾄﾞｾﾌﾞ療法	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
				パドセブ点滴静注(20,30mg/V)	1.25 mg/kg	1、8
泌尿器科	小細胞癌(泌尿器)	CE	28	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
泌尿器科	腎がん	トーリセル	7	トーリセル点滴静注液(25mg/V)	25 mg	1
泌尿器科	腎がん	Ipi+Nivo	21	オブジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
				ヤーボイ点滴静注液(20,50mg/V)	1 mg/kg	1
泌尿器科	腎がん	Ipi+Nivo(Nivo単独)	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
泌尿器科	腎がん	Nivo(2週毎)	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
泌尿器科	腎がん	Nivo(4週毎)	28	オブジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	480 mg	1
泌尿器科	腎がん	Avelumab＋Axitinib	14	バベンチオ点滴静注(200mg/V)	10 mg/kg	1
泌尿器科	腎がん	Adjuvant PEM(3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
泌尿器科	腎がん	Adjuvant PEM(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
泌尿器科	腎がん	Pembrolizumab+Axitinib	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
泌尿器科	腎がん	PEM+LEN(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ)	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
泌尿器科	精巣腫瘍	BEP	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	20 mg/㎡	1
				ブレオ注射用(5mg/V)	30 mg	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	20 mg/㎡	2～5
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～5
				ブレオ注射用(5mg/V)	30 mg	8、15
泌尿器科	精巣腫瘍	TIN療法	21	パクリタキセル注(30,100mg/V)	210 mg/㎡	1
				アクプラ静注用(10,50,100mg/V)	100 mg/㎡	2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400 mg	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1200 mg/㎡	2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	400 mg	3～6
				注射用イホマイド(1g/V)	1200 mg/㎡	3～6
泌尿器科	前立腺癌	Docetaxel	21	ドセタキセル点滴静注(20,80mg/V)	75 mg/㎡	1
泌尿器科	前立腺癌	カバジタキセル	21	ジェブタナ点滴静注(60mg/V)	25 mg/㎡	1
泌尿器科	膀胱内注入	MMC膀胱内注入	7	マイトマイシン注用(2,10mg/V)	20 mg	1
泌尿器科	膀胱内注入	THP膀胱内注入	7	テラルビシン注射用(膀胱内注入用)	30 mg	1
血液内科	その他(血内)	アクテムラ	14	アクテムラ点滴静注(200mg/V)	8 mg/kg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	ICE（4分割）	21	ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1250 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1250 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1250 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	3
				注射用イホマイド(1g/V)	1250 mg/㎡	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	ICE（5分割）	21	ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1000 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1000 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1000 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	3
				注射用イホマイド(1g/V)	1000 mg/㎡	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	ICE（6分割）	21	ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	833.3 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	833.3 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				ウロミテキサン注(400mg/V)	833.3 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	3
				注射用イホマイド(1g/V)	833.3 mg/㎡	3
血液内科	ホジキンリンパ腫	LEED	4	ウロミテキサン注(400mg/V)	24 mg/kg	1～2
				ラステット注(100mg/V)	165 mg/㎡	1～2
				ラステット注(100mg/V)	170 mg/㎡	1～2
				注射用エンドキサン(500mg/V)	60 mg/kg	1～2
				ラステット注(100mg/V)	170 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	165 mg/㎡	3
				アルケラン静注用(50mg/V)	65 mg/㎡	4
血液内科	ホジキンリンパ腫	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン(500mg/V)	500 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	アドセトリス	21	アドセトリス点滴静注(50mg/V)	1.8 mg/kg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	A+AVD	28	アドセトリス点滴静注(50mg/V)	1.2 mg/kg	1、15
				エクザール注射用(10mg/V)	6 mg/㎡	1、15
				ダカルバジン注用(100mg/V)	375 mg/㎡	1、15
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1、15
血液内科	ホジキンリンパ腫	A+AVd	28	アドセトリス点滴静注(50mg/V)	1.2 mg/kg	1、15
				エクザール注射用(10mg/V)	6 mg/㎡	1、15
				ダカルバジン注用(100mg/V)	250 mg/㎡	1、15
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1、15

血液内科	ホジキンリンパ腫	ABVD	28	エクザール注射用(10mg/V)	6 mg/㎡	1、15
				ダカルバジン注用(100mg/V)	375 mg/㎡	1、15
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1、15
				ブレオ注射用(5mg/V)	10 mg/㎡	1、15
血液内科	ホジキンリンパ腫	ABVd	28	エクザール注射用(10mg/V)	6 mg/㎡	1、15
				ダカルバジン注用(100mg/V)	250 mg/㎡	1、15
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	25 mg/㎡	1、15
				ブレオ注射用(5mg/V)	10 mg/㎡	1、15
血液内科	ホジキンリンパ腫	オブジーボ	14	オブジーボ点滴静注(2、4週用)(240mg/V)	240 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	21	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	200 mg	1
血液内科	ホジキンリンパ腫	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注(100mg/V)	400 mg	1
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン(500mg/V)	500 mg	1
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)寛解導入45歳未満	22	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	2〜3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./㎡	8、10、12、14、16、18、20、22
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	8、15、22
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)寛解導入45-60歳未満	22	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	2〜3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./㎡	8、10、12、14、16、18、20、22
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	8、15、22
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)寛解導入60歳以上	22	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	30 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	800 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	30 mg/㎡	2〜3
				ロイナーゼ注用	3000 K.U./㎡	8、10、12、14、16、18、20、22
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	8、15、22
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳未満(HD Ara-C phase)C1/C4	4	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	1〜3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1〜3
				ロイナーゼ注用	10000 K.U./㎡	4
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳未満(HD Ara-C phase)C1/C4【im_L-ASP】	4	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	1〜3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1〜3
				ロイナーゼ筋注用	10000 K.U./㎡	4
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳以上(HD Ara-C phase)C1/C4	4	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	1000 mg/㎡	1〜3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1〜3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./㎡	4
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳以上(HD Ara-C phase)C1/C4【im_L-ASP】	4	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	1000 mg/㎡	1〜3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1〜3
				ロイナーゼ筋注用	5000 K.U./㎡	4
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め50歳未満(HD MTX phase)C2/C5	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3000 mg/㎡	1、15
				ロイコボリン注3mg	51 mg	2、16
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3、17
				ロイナーゼ注用	10000 K.U./㎡	3、17
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3〜4、17〜18
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め50歳未満(HD MTX phase)C2/C5【im_L-ASP】	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3000 mg/㎡	1、15
				ロイコボリン注3mg	51 mg	2、16
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3、17
				ロイナーゼ筋注用	10000 K.U./㎡	3、17
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3〜4、17〜18
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め50歳以上・60歳未満(HD MTX phase)C2/C5	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	1500 mg/㎡	1、15
				ロイコボリン注3mg	51 mg	2、16
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3、17
				ロイナーゼ注用	10000 K.U./㎡	3、17
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3〜4、17〜18
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳以上(HD MTX phase)C2/C5	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、15
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	1500 mg/㎡	1、15
				ロイコボリン注3mg	51 mg	2、16
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3、17
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./㎡	3、17
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3〜4、17〜18
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳未満C3	42	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、8、15
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1、8、15

				ロイナーゼ注用	5000 K.U./㎡	2、4、6、9、11、13
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	29
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	29
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	30～33
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	36～40
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳以上C3	42	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、8、15
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	30 mg/㎡	1、8、15
				ロイナーゼ注用	3000 K.U./㎡	2、4、6、9、11、13
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	29
				注射用エンドキサン(500mg/V)	800 mg/㎡	29
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	30～33
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	36～40
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳未満C3【im_L-ASP】	42	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、8、15
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1、8、15
				ロイナーゼ筋注用	5000 K.U./㎡	2、4、6、9、11、13
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	29
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	29
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	30～33
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	36～40
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)地固め60歳以上C3【im_L-ASP】	42	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、8、15
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	30 mg/㎡	1、8、15
				ロイナーゼ筋注用	3000 K.U./㎡	2、4、6、9、11、13
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	29
				注射用エンドキサン(500mg/V)	800 mg/㎡	29
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	30～33
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	36～40
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 BcellPh(−)維持療法	28	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 60歳未満 寛解導入療法	22	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	2～3
				ロイナーゼ注用	5000 K.U./㎡	8、10、12、14、16、18、20、22
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	8、15、22
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 60歳未満 寛解導入療法【im_L-ASP】	22	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	2～3
				ロイナーゼ筋注用	5000 K.U./㎡	8、10、12、14、16、18、20、22
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	8、15、22
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 地固め C1/C4	4	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	1～3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～3
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213 Tcell-O 地固め C3 45歳未満	47	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1、8、15
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	30 mg/㎡	1、8、15
				アラノンジー静注用(250mg/V)	1500 mg/㎡	29、31、33
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	36
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	36
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	75 mg/㎡	37～40、43～47
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS強化地固め療法	31	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1～3
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	8、15、22
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS C1	24	メソトレキセート点滴静注液(5,50,200,1000mg/V)	100 mg/㎡	1
				メソトレキセート点滴静注液(5,50,200,1000mg/V)	900 mg/㎡	1
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	2
				ロイコボリン注3mg	15 mg	2
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	3
				ロイコボリン注3mg	15 mg	3
				ロイコボリン注3mg	15 mg	4
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS C2	22	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	45 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ALL213Ph+DAS 維持	35	オンコビン注射用(1mg/V)	1.3 mg/㎡	1
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ベスポンサ(1ｺｰｽ目)	21	ベスポンサ点滴静注用(1mg/V)	0.8 mg/㎡	1
				ベスポンサ点滴静注用(1mg/V)	0.5 mg/㎡	8、15
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ベスポンサ 非寛解(2ｺｰｽ目以降)	28	ベスポンサ点滴静注用(1mg/V)	0.8 mg/㎡	1
				ベスポンサ点滴静注用(1mg/V)	0.5 mg/㎡	8、15
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ベスポンサ 寛解後(2ｺｰｽ目以降)	28	ベスポンサ点滴静注用(1mg/V)	0.5 mg/㎡	1、8、15
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ビーリンサイト 1ｺｰｽ目(45kg以上)	42	ビーリンサイト点滴静注用(35μg/V)	31.5 μg	1～7
				ビーリンサイト点滴静注用(35μg/V)	98 μg	8～28
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ビーリンサイト 2～5ｺｰｽ目(45kg以上)	42	ビーリンサイト点滴静注用(35μg/V)	98 μg	1～28
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	ビーリンサイト 6～9ｺｰｽ目(45kg以上)	84	ビーリンサイト点滴静注用(35μg/V)	98 μg	1～28
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	アーウィナーゼ	7	アーウィナーゼ筋注用(10000U/V)	25000 単位/㎡	1、3、5

血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	CLL RIT 通常(濃度) 500mg/㎡【2コース目以降】	7	リツキサン注(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
血液内科	急性リンパ性白血病/慢性リンパ性白血病	CLL RIT 4倍濃縮 500mg/㎡【2コース目以降】	7	リツキサン注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	500 mg/㎡	1
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 DNR-AraC	14	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	100 mg/㎡	1～5
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	50 mg/㎡	1～5
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	100 mg/㎡	6～7
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 IDR-AraC	14	イダマイシン静注用(5mg/V)	12 mg/㎡	1～3
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	100 mg/㎡	1～3
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	100 mg/㎡	4～7
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 維持療法 HD-AraC	28	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	1～5
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 維持(D1)MIT-AraC	7	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	200 mg/㎡	1～3
				ノバントロン注(10mg/V)	7 mg/㎡	1～3
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	200 mg/㎡	4～5
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 維持(D2)DNR-AraC	7	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	200 mg/㎡	1～3
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	50 mg/㎡	1～3
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	200 mg/㎡	4～5
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 維持(D3)ACR-AraC	7	アクラシノン注射用(20mg/V)	20 mg/㎡	1～5
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	200 mg/㎡	1～5
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	AML201 維持(D4)A triple V	10	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	200 mg/㎡	1～5
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～5
				注射用フィルデシン(1,3mg/V)	2 mg/㎡	10
				オンコビン注射用(1mg/V)	0.8 mg/㎡	8
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	ビキセオス寛解導入療法	49	ビキセオス配合静注用(100U/V)	100 単位/㎡	1、3、5
				ビキセオス配合静注用(100U/V)	100 単位/㎡	15、17
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	ビキセオス地固め療法	35	ビキセオス配合静注用(100U/V)	65 単位/㎡	1、3
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	GO	14	マイロターグ点滴静注用(5mg/V)	9 mg/㎡	1
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	GML200 BHAC-DNR(70歳以上)	28	サンラビン点滴静注用(200mg/V)	200 mg/㎡	1～3
				ダウノマイシン静注用(20mg/V)	30 mg/㎡	1～3
				サンラビン点滴静注用(200mg/V)	200 mg/㎡	4～8
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	JPLSG AML-12 HCEI	6	イダマイシン静注用(5mg/V)	10 mg/㎡	1
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	3000 mg/㎡	1～3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～5
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	Vidaza(静注)	28	ビダーザ注射用(静注)(100mg/V)	75 mg/㎡	1～7
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	Vidaza(皮下注)	28	ビダーザ注射用(皮下注)(100mg/V)	75 mg/㎡	1～7
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	MDS200 CA(70歳未満)	14	アクラシノン注射用(20mg/V)	14 mg/㎡	1～4
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	10 mg/㎡	1～14
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	MDS200 CA(70歳以上)	14	アクラシノン注射用(20mg/V)	10 mg/㎡	1～4
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	10 mg/㎡	1～14
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	MDS200 CAG(70歳未満)	14	アクラシノン注射用(20mg/V)	14 mg/㎡	1～4
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	10 mg/㎡	1～14
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	MDS200 CAG(70歳以上)	14	アクラシノン注射用(20mg/V)	10 mg/㎡	1～4
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	10 mg/㎡	1～14
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	Low dose Ara-C	14	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	10 mg/㎡	1～14
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	Low dose Ara-C(ﾍﾟﾈｸﾚｸｽﾀ併用)	28	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	20 mg/㎡	1～10
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	CVG	28	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	20 mg	1～14
				ラステット注(100mg/V)	50 mg	1～14
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	MEC(変法)	7	ノバントロン注(10mg/V)	6 mg/㎡	1～3
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	100 mg/㎡	1～7
				ラステット注(100mg/V)	80 mg/㎡	1～7
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	E-CAG	14	ラステット注(100mg/V)	30 mg/㎡	1～4
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	10 mg/㎡	1～14
				アクラシノン注射用(20mg/V)	14 mg/㎡	5～8
血液内科	急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群	FLAG-M	6	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	2～5
				フルダラ静注用(50mg/V)	15 mg/㎡	2～5
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	3～6
				フルダラ静注用(50mg/V)	15 mg/㎡	3～6
				ノバントロン注(10mg/V)	10 mg/㎡	4～6
血液内科	急性前骨髄性白血病	(再発用)トリセノックス寛解導入	60	トリセノックス点滴静注(12mg/A)	0.15 mg/kg	1～3
				トリセノックス点滴静注(12mg/A)	0.15 mg/kg	4～60
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL212 C1/C3 ATO	7	トリセノックス点滴静注(12mg/A)	0.15 mg/kg	1～5
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL212 C4 GO	14	マイロターグ点滴静注用(5mg/V)	4 mg/㎡	1
血液内科	急性前骨髄性白血病	APL205R BU-LPAM	5	ブスルフェクス点滴静注用(60mg/V)	0.8 mg/kg	1～3
				アルケラン静注用(50mg/V)	70 mg/㎡	4～5
血液内科	髄注	(i.t.)MTX-AraC-PSL	1	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	40 mg	1
				注射用メソトレキセート(5,50mg/V)	15 mg	1
血液内科	髄注	髄注JALSG202-O Ph(-)	1	注射用メソトレキセート(5,50mg/V)	15 mg	1
血液内科	髄注	髄注JALSG Ph(-)B-ALL213	1	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	40 mg	1
				注射用メソトレキセート(5,50mg/V)	15 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン(500mg/V)	500 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	VELCADE (週2回/3週ｻｲｸﾙ)	21	ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、4、8、11
血液内科	多発性骨髄腫	VELCADE (週1回/4週ｻｲｸﾙ)	28	ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】(1コース目)	28	カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	20 mg/㎡	1～2
				カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	27 mg/㎡	8～9、15～16

血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】(2～12コース目)	28 カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	27 mg/㎡	1～2、8～9、15～16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【KRd】(13コース以降)	28 カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	27 mg/㎡	1～2、15～16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【Kd、IsaKd、DKd】(1コース目)	28 カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	20 mg/㎡	1～2
			カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	56 mg/㎡	8～9、15～16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス【Kd、IsaKd、DKd】(2コース以降)	28 カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	56 mg/㎡	1～2、8～9、15～16
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス週1【Kd】(1コース目)	28 カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	20 mg/㎡	1
			カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	70 mg/㎡	8、15
血液内科	多発性骨髄腫	カイプロリス週1【Kd】(2コース以降)	28 カイプロリス点滴静注(10,40mg/V)	70 mg/㎡	1、8、15
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【ERd】(1ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1
			エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	15、22
			エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【ERd】(2ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1、8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【EPd】(1ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1
			エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	15、22
			エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【EPd】(2ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1、8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【ERd】(1・2ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1、8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【EPd】(1・2ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1、8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ2(1ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1
			エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	15、22
			エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ2(2ｺｰｽ)〔毎週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1、8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【ERd】(3ｺｰｽ以降)〔1回/2週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	10 mg/kg	1、15
血液内科	多発性骨髄腫	エムプリシティ【EPd】(3ｺｰｽ以降)〔1回/4週：4週ｻｲｸﾙ〕	28 エムプリシティ点滴静注(300,400mg/V)	20 mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	エンドキサン大量	7 ウロミテキサン注(400mg/V)	800 mg/㎡	1～2
			注射用エンドキサン(500mg/V)	2000 mg/㎡	1～2
血液内科	多発性骨髄腫	大量L-PAM(200)	7 アルケラン静注用(50mg/V)	100 mg/㎡	1～2
血液内科	多発性骨髄腫	ｻｰｸﾘｻ 10mg/kg(1ｺｰｽ目)【IsaPd、IsaKd】	28 サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
			サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	15、22
			サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	ｻｰｸﾘｻ皮下注(1ｺｰｽ目)【IsaPd、IsaKd】	28 臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	1
			臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	8、15、22
血液内科	多発性骨髄腫	ｻｰｸﾘｻ 10mg/kg(2ｺｰｽ目以降)【IsaPd、IsaKd】	28 サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1、15
血液内科	多発性骨髄腫	ｻｰｸﾘｻ皮下注(2ｺｰｽ目以降)【IsaPd、IsaKd】	28 臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	1、15
血液内科	多発性骨髄腫	ｻｰｸﾘｻ 20mg/kg(1ｺｰｽ目)【Isa-d、Isa単剤】	28 サークリサ点滴静注(生食500ml)(100,500mg/V)	20 mg/kg	1
			サークリサ点滴静注(生食500ml)(100,500mg/V)	20 mg/kg	15、22
			サークリサ点滴静注(生食500ml)(100,500mg/V)	20 mg/kg	8
血液内科	多発性骨髄腫	ｻｰｸﾘｻ 20mg/kg(2ｺｰｽ目以降)【Isa-d、Isa単剤】	28 サークリサ点滴静注(生食500ml)(100,500mg/V)	20 mg/kg	1、15
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd(1ｺｰｽ目)	42 サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、4
			サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	15、22、29
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	22、25、29、32
			サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	8
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	8、11
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd(2～4ｺｰｽ目)	42 サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1、15、29
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、4、8、11、22、25、29、32
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd(5～17ｺｰｽ目)	28 サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1、15
血液内科	多発性骨髄腫	IsaVRd(18ｺｰｽ目以降)	28 サークリサ点滴静注(100,500mg/V)	10 mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	Isa(皮下注)VRd(1ｺｰｽ目)	42 臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	1
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、4、8、11、22、25、29、32
			臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	8、15、22、29
血液内科	多発性骨髄腫	Isa(皮下注)VRd(2～4ｺｰｽ目)	42 臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	1、15、29
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、4、8、11、22、25、29、32
血液内科	多発性骨髄腫	Isa(皮下注)VRd(5～17ｺｰｽ目)	28 臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	1、15
血液内科	多発性骨髄腫	Isa(皮下注)VRd(18ｺｰｽ目以降)	28 臨)サークリサ皮下注1400mg10mL	1 V	1
血液内科	多発性骨髄腫	ダラキューロ	7 ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	VTD-PACE	21 シスプラチン注(10,50mg/V)	10 mg/㎡	1～4
			ドキソルビシン(10,50mg/V)	10 mg/㎡	1～4
			ラステット注(100mg/V)	40 mg/㎡	1～4
			注射用エンドキサン(500mg/V)	400 mg/㎡	1～4
血液内科	多発性骨髄腫	ｴﾙﾚﾌｨｵ皮下注(ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ用量)	7 エルレフィオ皮下注(44mg/V)	12 mg	1
			エルレフィオ皮下注(44mg/V)	32 mg	4
血液内科	多発性骨髄腫	ｴﾙﾚﾌｨｵ皮下注(標準用量)	7 エルレフィオ皮下注(76mg/V)	76 mg	1
血液内科	多発性骨髄腫	DCEP	21 シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	10 mg/㎡	1～4
			ラステット注(100mg/V)	40 mg/㎡	1～4
			注射用エンドキサン(500mg/V)	400 mg/㎡	1～4
血液内科	多発性骨髄腫	【ﾃｽﾄ】Bela-Vd(1～8ｺｰｽ目)	21 ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1
			ﾌﾞｰﾚﾝﾚｯﾌﾟ点滴静注用(100mg/V)	2.5 mg/kg	1
			ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	4、8、11
血液内科	多発性骨髄腫	【ﾃｽﾄ】Bela-Vd(9ｺｰｽ目以降)	21 ﾌﾞｰﾚﾝﾚｯﾌﾟ点滴静注用(100mg/V)	2.5 mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	ﾃｸﾍﾞｲﾘ皮下注(1～3回目)	11 ﾃｸﾍﾞｲﾘ皮下注(30mg/V)	0.06 mg/kg	1
			ﾃｸﾍﾞｲﾘ皮下注(30mg/V)	0.3 mg/kg	3

				ﾃｸﾍﾞｲﾘ皮下注(153mg/V)	1.5 mg/kg	5
血液内科	多発性骨髄腫	ﾃｸﾍﾞｲﾘ皮下注(4回目以降)	7	ﾃｸﾍﾞｲﾘ皮下注(153mg/V)	1.5 mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(A法:1～3回目)	11	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(3mg/V)	0.01 mg/kg	1
				ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(3mg/V)	0.06 mg/kg	3
				ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(40mg/V)	0.4 mg/kg	5
血液内科	多発性骨髄腫	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(A法:4回目以降)	7	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(40mg/V)	0.4 mg/kg	1
血液内科	多発性骨髄腫	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(B法:1～4回目)	20	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(3mg/V)	0.01 mg/kg	1
				ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(3mg/V)	0.06 mg/kg	3
				ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(40mg/V)	0.4 mg/kg	5
				ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(40mg/V)	0.8 mg/kg	7
血液内科	多発性骨髄腫	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(B法:5回目以降)	14	ﾀｰﾋﾞｰ皮下注(40mg/V)	0.8 mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ(1コース目【1～3回目】)	7	ガザイバ点滴静注(1000mg/V)	1000 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ(2コース目以降)	21	ガザイバ点滴静注(1000mg/V)	1000 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ガザイバ メンテナンス	56	ガザイバ点滴静注(1000mg/V)	1000 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT 通常(濃度)	7	リツキサン注(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT 4倍濃縮	7	リツキサン注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT メンテナンス 通常(濃度)	7	リツキサン注(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT メンテナンス 4倍濃縮	7	リツキサン注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_BS 通常(濃度)	7	リツキシマブBS注(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	RIT_BS 4倍濃縮	7	リツキシマブBS注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHOP	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	Pola-CHP	21	ドキソルビシン(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				ポライビー点滴静注用(30,140mg/V)	1.8 mg/kg	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	V(R)-CAP	21	ドキソルビシン(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750 mg/㎡	1
				ベルケイド注射用(皮下注)(3mg/V)	1.3 mg/㎡	1、4、8、11
血液内科	非ホジキンリンパ腫	A+CHP	21	アドセトリス点滴静注(50mg/V)	1.8 mg/kg	1
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	THP-COP	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1 mg/㎡	1
				テラルビシン注射用(10,20mg/V)	40 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	650 mg/㎡	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHASE	21	注射用エンドキサン(500mg/V)	1200 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～3
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	2～3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DeVIC	21	ウロミテキサン注(400mg/V)	300 mg/㎡	1
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	300 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				ウロミテキサン注(400mg/V)	300 mg/㎡	1～3
				注射用イホマイド(1g/V)	1500 mg/㎡	1～3
				ウロミテキサン注(400mg/V)	300 mg/㎡	2～3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	GCD	21	カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	GDP	21	シスプラチン注(500ml)(10,50mg/V)	75 mg/㎡	1
				ゲムシタビン点滴静注用(200mg,1g/V)	1000 mg/㎡	1、8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE（4分割）	21	ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1250 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1250 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1250 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	3
				注射用イホマイド(1g/V)	1250 mg/㎡	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE（5分割）	21	ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1000 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	1000 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				ウロミテキサン注(400mg/V)	1000 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	3
				注射用イホマイド(1g/V)	1000 mg/㎡	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ICE（6分割）	21	ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1～2
				ウロミテキサン注(400mg/V)	833.3 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				カルボプラチン注射液(50,150,450mg/V)	5 AUC	2
				注射用イホマイド(1g/V)	833.3 mg/㎡	2 ※計5000mg/㎡
				ウロミテキサン注(400mg/V)	833.3 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	3
				注射用イホマイド(1g/V)	833.3 mg/㎡	3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(1・2段階増量) ※1.2倍増量可	21	オンコビン注射用(1mg/V)	0.4 mg/㎡	1～4
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	10 mg/㎡	1～4

				ラステット注(100mg/V)	50 mg/㎡	1～4
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750 mg/㎡	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(3・4段階増量) ※1.2倍増量可	21	オンコビン注射用(1mg/V)	0.4 mg/㎡	1～4
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	14 mg/㎡	1～4
				ラステット注(100mg/V)	70 mg/㎡	1～4
				注射用エンドキサン(500mg/V)	1050 mg/㎡	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BENDA(90mg/㎡)【初発BR・Ibr+BR、初発・再発難治G-BENDA】	28	トレアキシン点滴静注液(100mg/V)	90 mg/㎡	1～2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BENDA(120mg/㎡)【再発難治単独・DLBCL BR】	21	トレアキシン点滴静注液(100mg/V)	120 mg/㎡	1～2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	POLA-BENDA	21	トレアキシン点滴静注液(100mg/V)	90 mg/㎡	1
				ポライビー点滴静注用(30,140mg/V)	1.8 mg/kg	1
				トレアキシン点滴静注液(100mg/V)	90 mg/㎡	2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ポテリジオ	7	ポテリジオ点滴静注(20mg/V)	1 mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	Hyper-CVAD(Hyper-CVAD/MA交替療法)	21	注射用エンドキサン(500mg/V)	300 mg/㎡	1～3
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	25 mg/㎡	4
				オンコビン注射用(1mg/V)	1.4 mg/㎡	4、11
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	25 mg/㎡	5
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MA(Hyper-CVAD/MA交替療法)	21	メソトレキセート点滴静注液(5,50,200,1000mg/V)	200 mg/㎡	1
				メソトレキセート点滴静注液(5,50,200,1000mg/V)	800 mg/㎡	1
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	2～3
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	2～3
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3
				ロイコボリン注3mg	15 mg/㎡	3～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	LEED	4	ウロミテキサン注(400mg/V)	24 mg/kg	1～2
				ラステット注(100mg/V)	165 mg/㎡	1～2
				ラステット注(100mg/V)	170 mg/㎡	1～2
				注射用エンドキサン(500mg/V)	60 mg/kg	1～2
				ラステット注(100mg/V)	165 mg/㎡	3
				ラステット注(100mg/V)	170 mg/㎡	3
				アルケラン静注用(50mg/V)	65 mg/㎡	4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MTX(3.5g/㎡)＋AraC	21	メソトレキセート点滴静注液(5,50,200,1000mg/V)	500 mg/㎡	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3000 mg/㎡	1
				キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	2000 mg/㎡	2～3
				ロイコボリン注3mg	24 mg	2～3
				ロイコボリン注3mg	24 mg	3～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MTX(3.5g/㎡)	14	メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3500 mg/㎡	1
				ロイコボリン注3mg	24 mg	2～3
				ロイコボリン注3mg	24 mg	2～4
				ロイコボリン注3mg	24 mg	3～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エンドキサン単独	1	注射用エンドキサン(500mg/V)	500 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	CHOEP	21	オンコビン注射用(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1
				ドキソルビシン(10,50mg/V)	50 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	1
				注射用エンドキサン(500mg/V)	750 mg/㎡	1
				ラステット注(100mg/V)	100 mg/㎡	2～3
血液内科	非ホジキンリンパ腫	プララトレキサート	49	ジフォルタ注射液(20mg/V)	30 mg/㎡	1、8、15、22、29、36
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ロミデプシン	28	イストダックス点滴静注用(10mg/V)	14 mg/㎡	1、8、15
血液内科	非ホジキンリンパ腫	アドセトリス【再発PTCL】	21	アドセトリス点滴静注(50mg/V)	1.8 mg/kg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MR-(CHOP)	21	メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	2000 mg/㎡	1
				ロイコボリン注3mg	21 mg	2～3
				ロイコボリン注3mg	21 mg	2～4
				ロイコボリン注3mg	21 mg	3～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MPV(奇数コース)	14	オンコビン注射用(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3500 mg/㎡	1
				プロカルバジン	100 mg/㎡(体表面積別)	1～7
				ロイコボリン注3mg	24 mg	2～3
				ロイコボリン注3mg	24 mg	3～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	MPV(偶数コース)	14	オンコビン注射用(1mg/V)	1.4 mg/㎡	1
				メソトレキセート点滴静注液(500ml)(5,50,200,1000mg	3500 mg/㎡	1
				ロイコボリン注3mg	24 mg	2～3
				ロイコボリン注3mg	24 mg	3～4
血液内科	非ホジキンリンパ腫	HD-AraC(3g)	28	キロサイド(シタラビン)(20,200,400,1000mg/本)	3000 mg/㎡	1～2
血液内科	非ホジキンリンパ腫	BU-TT	8	ブスルフェクス点滴静注用(60mg/V)	3.2 mg/kg	1～4
				リサイオ点滴静注液(100mg/V)	5 mg/kg	5～6
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エプキンリ皮下注(1ｻｲｸﾙ目 or 再開用)	28	エプキンリ皮下注(4mg/V)	0.16 mg	1
				エプキンリ皮下注(48mg/V)	48 mg	15
				エプキンリ皮下注(48mg/V)	48 mg	22
				エプキンリ皮下注(4mg/V)	0.8 mg	8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エプキンリ皮下注(2～3ｻｲｸﾙ目)	28	エプキンリ皮下注(48mg/V)	48 mg	1、8、15、22
血液内科	非ホジキンリンパ腫	エプキンリ皮下注(4ｻｲｸﾙ目以降)	14	エプキンリ皮下注(48mg/V)	48 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ポライビー＋ルンスミオ(1ｻｲｸﾙ目)	21	ポライビー点滴静注用(30,140mg/V)	1.8 mg/kg	1
				ルンスミオ皮下注(5,45mg/V)	5 mg	1
				ルンスミオ皮下注(5,45mg/V)	45 mg	15

				ルンスミオ皮下注(5.45mg/V)	45 mg	8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ポライビー＋ルンスミオ(2～6ｻｲｸﾙ目)	21	ポライビー点滴静注用(30,140mg/V)	1.8 mg/kg	1
				ルンスミオ皮下注(5.45mg/V)	45 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ポライビー＋ルンスミオ(7～8ｻｲｸﾙ目)	21	ルンスミオ皮下注(5.45mg/V)	45 mg	1
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ-R2(1ｺｰｽ目)	28	リツキシマブBS注(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	1
				リツキシマブBS注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	15
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	15
				リツキシマブBS注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	22
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	22
				リツキシマブBS注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	8
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	8
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ-R2(2・3ｺｰｽ目)	28	リツキサン注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	1
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	8、15、22
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ-R2(4・5ｺｰｽ目)	28	リツキサン注(2.5倍希釈)(100,500mg/V)	375 mg/㎡	1
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	1
				ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	15
血液内科	非ホジキンリンパ腫	ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ-R2(6～12ｺｰｽ目)	28	ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ点滴静注用(200mg/V)	12 mg/kg	1、15